

(案)

ジノテフラン 農薬使用者安全評価書

2026年9月17日

農業資材審議会農薬分科会

農薬使用者安全評価部会

目 次

<経緯>	2
<農薬使用者安全評価部会出席者名簿>	2
I. 評価対象農薬の概要	3
1. 有効成分の概要	3
2. 有効成分の物理的・化学的性状	4
3. 申請に係る情報	5
4. 作用機作	5
5. 適用病虫害雑草等の範囲及び使用方法	5
II. 安全性に係る試験の概要	6
1. 経口吸収率	6
2. 毒性試験の結果概要	10
3. 公表文献における研究結果（資料 48、49、50）	11
3.1 ヒトにおける知見	14
3.1.1 疫学研究	14
3.1.2 その他の情報（バイオモニタリング）	16
III. 農薬使用者暴露許容量（AOEL）	18
IV. 急性農薬使用者暴露許容量（AAOEL）	22
V. 暴露量の推計	24
1. 経皮吸収試験	24
2. 圃場における農薬使用者暴露	29
3. 暴露量の推計	29
VI. リスク評価結果	29
評価資料	30

＜経緯＞

令和4年（2022年）12月14日	農業資材審議会への諮問（再評価）
令和8年（2026年）9月17日	農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全 評価部会（第27回）

＜農薬使用者安全評価部会出席者名簿＞

（第27回）

（委員）	（臨時委員）	（専門委員）	（専門参考人）
櫻井 裕之	天野 昭子	相崎 健一	小坂 忠司
		石井 雄二	
		藤堂 浩明	
		成田 伊都美	
		元村 淳子	

ジノテフラン

I. 評価対象農薬の概要

1. 有効成分の概要

1.1 申請者 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

1.2 登録名 ジノテフラン
(*RS*)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン

1.3 一般名 dinotefuran (ISO)


1.4 化学名
IUPAC 名 : (*EZ*)-(*RS*)-1-methyl-2-nitro-3-[(tetrahydro-3-furyl)methyl]
guanidine

CAS 名 : *N*-methyl-*N*²-nitro-*N*^{2'}[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]
guanidine
(CAS No. 165252-70-0)

1.5 分子式、構造式、分子量

分子式 C₇H₁₄N₄O₃

構造式



分子量 202.22

2. 有効成分の物理的・化学的性状

試験項目			純度(%)	試験方法	試験結果	
蒸気圧			99.7	OECD 104	<1.7 × 10 ⁻⁶ Pa (30 °C) <1.8 × 10 ⁻⁶ Pa (40 °C) <2.1 × 10 ⁻⁶ Pa (50 °C)	
融点			99.7	OECD 102	108 °C	
沸点			99.7	OECD 103	測定不能(208.3 °Cで分解)	
熱安定性			99.7	OECD 113	150 °Cまで安定	
溶解度	水		99.7	OECD 105	39.8 g/L (20 °C)	
	有機溶媒	ヘキサン	99.7	OECD 105	0.0090 mg/L (20 °C)	
		ヘプタン			0.0105 mg/L (20 °C)	
		キシレン			71.8 mg/L (20 °C)	
		トルエン			149 mg/L (20 °C)	
		ジクロロメタン			60.9 g/L (20 °C)	
		アセトン			57.8 g/L (20 °C)	
		メタノール			57.2 g/L (20 °C)	
		エタノール			19.4 g/L (20 °C)	
		酢酸エチル			5.17 g/L (20 °C)	
解離定数 (pK _a)			99.7	OECD 112	12.6 (20 °C)	
1-オクタノール／水分配係数 (log P _{ow})			99.7	OECD 107	-0.549 (25 °C)	
加水分解性			99.6	OECD 111	安定 (25 °C、60日間、pH 4、7及び9)	
			99.5	OECD 111	安定 (50 °C、5日間、pH 4、7及び9)	
水中光分解性			99.6	9 農産第 5089 号	半減期 3.8 時間(滅菌精製水、25 °C、400 W/m ² 、300～800 nm)	
紫外可視吸収 (UV/VIS) スペクトル			99.7	極大吸収波長 (nm)	吸光度	モル吸光係数 (L mol ⁻¹ cm ⁻¹)
				中性		
				206	0.672	6460
				269	1.30	12500
				酸性		
				268	1.05	12600
				アルカリ性		
				268	0.887	10700

3. 申請に係る情報

令和 4 年（2022 年）3 月 11 日～3 月 30 日に、再評価を受けるべき者から農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第 8 条第 3 項に基づく試験成績等を受理した。

ジノテフランは、令和 8 年（2026 年）9 月現在、米国等の国々で登録されている。

4. 作用機作

ジノテフランはネオニコチノイド系化合物であり、昆虫神経のシナプス後膜のニコチン性アセチルコリン受容体に作用し、シナプス伝達の遮断を起こし、殺虫作用を示す。

(IRAC 分類：4A※)

※参照：<https://irac-online.org>

5. 適用病害虫雑草等の範囲及び使用方法

評価対象となるジノテフランを含有する農薬 80 製剤について、適用病害虫雑草等の範囲及び使用方法を別添 1 に示す。



Ⅱ．安全性に係る試験の概要

ジノテフランは、令和 8 年（2026 年）7 月 29 日、内閣府食品安全委員会において、食品健康影響評価（資料 1）がなされている。食品安全委員会では評価に用いた試験成績において、過去のテストガイドラインに基づき実施されている試験も確認されたが、ジノテフランの代謝・毒性プロファイルを適切に把握できることから、評価は可能と判断されている。

1. 経口吸収率

ジノテフランのテトラヒドロフラン環 4 位の炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[tet- ^{14}C]ジノテフラン」という。）、ジノテフランのグアニジンの炭素を ^{14}C で標識したもの（以下「[gua- ^{14}C]ジノテフラン」という。）（表 1）を用いた動物代謝試験による動物体内への吸収率（経口吸収率）の概要をまとめた。

表 1 標識化合物

略称	[tet- ^{14}C]ジノテフラン	[gua- ^{14}C]ジノテフラン
構造式		
標識位置	テトラヒドロフラン環4位の炭素を標識	グアニジンの炭素を標識

① ラット（資料 2、GLP）（資料 3、非 GLP）

SD ラットを用いた動物代謝試験が実施された。

試験条件の概要は表 2 に示されている。

表 2 ラットにおける動物代謝試験条件の概要

試験区分	①	②	③	④
標識体	[tet- ^{14}C]ジノテフラン及び [gua- ^{14}C]ジノテフランの等量混合物		[tet- ^{14}C] ジノテフラン	[gua- ^{14}C] ジノテフラン
投与量	50 mg/kg 体重	1,000 mg/kg 体重	200 mg/kg 体重	200 mg/kg 体重
投与経路	経口			
投与回数	1	1	1	1
動物/群	雌雄 各 3～5	雌雄 各 3～5	雄 1～3	雄 1～3

a. 尿及び糞中排泄－1（資料 2、GLP）

①及び②の各試験における尿及び糞中排泄率は表 3 に示されている。いずれの試験においても、投与放射能は主に尿中に排泄された。

投与後 24 時間で、尿中に 84.3%TAR～98.9%TAR が排泄され、投与後 168時間で、尿中に 87.7%TAR～99.8%TAR、糞中に 1.19%TAR～2.39%TAR が排出された。

表 3 投与後 168 時間における尿及び糞中排泄率 (%TAR)

試験区分	①		②	
投与量	50 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
尿	98.9	99.8	90.1	87.7
糞	1.66	1.19	2.15	2.39
ケージリンス ^a	0.49	0.15	1.04	1.61
ケージ洗浄液	0.38	0.24	0.54	0.85
ケージ拭き取り	0.46	0.23	0.94	0.21
カーカス及び組織	0.06	0.08	0.10	0.06
経口吸収率 ^b	100	101	92.7	90.4
総回収率	102	102	94.9	92.8

表の値は 5 匹の平均値

^a : 投与 24 時間後に回収した。

^b : 尿、ケージリンス、ケージ洗浄液、ケージ拭き取り並びにカーカス及び組織の合計

b. 尿及び糞中排泄－ 2 （資料 3、非 GLP）

③及び④の各試験における尿及び糞中排泄率は表 4 に示されている。

投与放射能は主に尿中に排泄され、投与後 120 時間で 93%TAR 以上が尿中に排泄された。糞中への排泄は 5%TAR で、標識位置による差は認められなかった。

表 4 投与 120 時間後の尿及び糞中排泄率 (%TAR)

試験区分	③	④
標識体	[tet- ¹⁴ C]ジノテフラン	[gua- ¹⁴ C]ジノテフラン
投与量	200 mg/kg 体重	
尿	93.2	98.6
糞	5.19	4.99
経口吸収率 ^a	93.2	98.6
総回収率	98.4	104

表の値は雄 1 匹における測定値

^a : 尿の値

c. 胆汁中排泄－ 1 （資料 2、GLP）

試験①及び②の条件で、胆管カニューレを挿入した SD ラット（一群雌雄各 4 匹）を用いた胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 48 時間の尿、糞及び胆汁中排泄率並びに動物体残存率は表 5 に示されている。

投与後 48 時間の胆汁中への排泄は 0.58%TAR～0.88%TAR であり、尿中

への排泄は 85.2%TAR～94.7%TAR、糞中への排泄は 1.08%TAR～1.34%TAR であった。

本試験より得られた胆汁、尿、ケージリンス、ケージ洗浄液及びケージ拭き取りの合計より、単回投与後 48 時間の吸収率は 50 mg/kg 体重投与群で 97.4～98.0%、1,000 mg/kg 体重投与群で 93.0～95.0%であると算出された。なお、動物体については、消化管内容物が含まれている可能性があり、吸収されたか不明であったため、吸収率の計算には含めなかった。

表 5 投与後 48 時間の尿、糞及び胆汁中排泄率並びに動物体残存率 (%TAR)

試験	①		②	
投与量	50 mg/kg 体重		1,000 mg/kg 体重	
性別	雄	雌	雄	雌
胆汁	0.62	0.58	0.78	0.88
尿	94.7	90.9	85.2	90.3
糞	1.08	1.21	1.33	1.34
動物体	0.39	0.51	0.38	2.43
ケージリンス ^a	0.63	2.36	1.15	1.42
ケージ洗浄液	0.65	2.20	1.27	1.63
ケージ拭き取り	1.42	1.39	4.62	0.78
経口吸収率 ^b	98.0	97.4	93.0	95.0
総回収率	99.5	99.2	94.7	98.8

動物体：排泄物の最終採取後のと体

表の値は 50 mg/kg 体重投与群は 4 匹、1,000 mg/kg 体重投与群は 3 匹の平均値

^a：投与 24 時間後に回収した。

^b：胆汁、尿、ケージリンス、ケージ洗浄液及びケージ拭き取りの合計

d. 胆汁中排泄－2（資料 3、非 GLP）

試験③及び④の条件で、胆管カニューレを挿入した SD ラット（一群雄 3 匹）を用いた胆汁中排泄試験が実施された。

投与後 48 時間の尿、糞及び胆汁中排泄率は表 6 に示されている。

投与後 48 時間の胆汁への排泄は、0.63%TAR～0.82%TAR であり、排泄における胆汁経路の関与は僅かと考えられた。

本試験より得られた胆汁及び尿の合計より、単回投与後 48 時間の吸収率は 200 mg/kg 体重投与群で 98.7～101%であると算出された。

表 6 投与後 48 時間の尿、糞及び胆汁中排泄率 (%TAR)

試験	③	④
標識体	[tet- ¹⁴ C]ジノテフラン	[gua- ¹⁴ C]ジノテフラン
投与量	200 mg/kg 体重	
胆汁	0.82	0.63
尿	97.9	99.9
糞	3.10	3.46
経口吸収率 ^a	98.7	101
総回収率	102	104

表の値は雄 3 匹の平均値

^a : 胆汁及び尿の合計

2. 毒性試験の結果概要

各種毒性試験（資料 4～47）の結果は、資料 1（食品安全委員会農薬評価書）の II.安全性に係る試験の概要を参照した。

ジノテフランの急性経口毒性試験の LD₅₀ はラットで 2,000 mg/kg 体重、マウスで 2,280 mg/kg 体重であった。経皮、吸入のいずれの投与経路においても急性毒性は弱く（LD₅₀（経皮）：>2,000 mg/kg 体重、LC₅₀（吸入）：>4.09 mg/L）、皮膚及び眼に対して軽度の刺激性が認められ、皮膚感作性は陰性であった。

ジノテフラン投与による影響は主に体重（増加抑制）に認められた。発がん性、神経毒性、発達神経毒性、繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性、免疫毒性及び発達免疫毒性は認められなかった。

疫学研究について、ジノテフランの食品を通じた摂取に係る健康影響への懸念を示す知見はなかった。

イヌの 90 日間反復経口投与毒性試験において、雌で無毒性量が設定できなかったが、より低い用量でより長期に実施されたイヌの 1 年間反復経口投与毒性試験で雌の無毒性量が得られており、イヌの雌における無毒性量の設定は可能であると考えられた。

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、イヌを用いた 1 年間反復経口投与毒性試験の無毒性量 22 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として安全係数 100 で除した 0.22 mg/kg 体重/日を許容一日摂取量（ADI）と設定した。

また、ジノテフランの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験②の無毒性量 125 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100 で除した 1.2 mg/kg 体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。

3. 公表文献における研究結果（資料 48、49、50）

表 7 に示すデータベース [Web of Science (Core Collection) 及び J-STAGE] を用いて、それぞれ 2006 年 7 月 1 日～2021 年 7 月 3 日を検索対象期間として、有効成分名及びジノテフランを含む製剤名をキーワードとして公表文献を検索し、評価対象となる影響、評価対象の生物種等についてガイドライン¹で定めるキーワードで絞り込みが行われた。

その結果、全文に基づく適合性評価の対象となったヒトに対する毒性の分野（動物を用いた研究、疫学研究等）に該当するとして収集された公表文献 1,670 報（データベース間等での重複を含む。）のうち、評価の目的と適合するものとして 16 報の公表文献が提出された。

海外評価機関が作成した評価書中に引用されている公表文献のうち、ヒトに対する毒性の分野に該当する公表文献は 1 報であった。

公表文献に関する情報募集等からの情報提供により、公表文献 8 報（公表文献検索による収集との重複を含む。）が追加された。また、2026 年 4 月 8 日～5 月 7 日にジノテフランに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）に対して実施した国民からの意見・情報の募集により、公表文献 2 報が追加された。

以上から、疫学以外については 12 報、疫学については 11 報の公表文献が選択された。評価目的との適合性等の観点から、さらに本部会で検討²した結果、疫学について公表文献 9 報（II.3.1）を評価に使用する公表文献と判断した。

¹ 公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（令和 3 年 9 月 22 日 農業資材審議会農薬分科会決定、令和 5 年 7 月 27 日一部改正）

² 「農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会での公表文献の取扱いについて（令和 4 年 9 月 2 日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会決定）」に基づく検討。

表 7 ジノテフランに関する公表文献の検索結果

データベース名	Web of Science(Core Collection) ^a
検索対象期間	2006/7/1～2021/7/3
データベース名	J-STAGE
検索対象期間	2006/7/1～2021/7/3
検索結果（全データベースの検索結果を統合したもの）	
対象とする農薬名で検索抽出した総論文数	7,092 ^b
ヒトに対する毒性の分野の論文数	1,670 ^{bc}
全文に基づく適合性評価の対象となったヒトに対する毒性の分野の論文数	26
全文に基づく適合性評価の結果、評価の目的と適合するとした文献数	16
調査対象とした海外評価書	EFSA等評価書 ^d
評価書に引用されたヒトに対する毒性の分野の文献数	1

a：令和5年7月に文献ガイドラインが一部改正されたため、改正後の文献ガイドラインに照らし、追加でWeb of Science（Core Collection）を用いた収集を実施。

b：データベース間等での重複あり

c：他の評価分野との重複あり

d：調査対象とした評価書は下記のとおり

- ・ ECHA (2014): Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance: Dinotefuran, Product type: 18. ECHA/BPC/006/2014
- ・ UK (2014): Regulation (EU) No 528/2012 assessment report dinotefuran, producttype 18 (insecticides, acaricides and to control other arthropods), dated 17 June 2014
- ・ Anonymous (2012): White paper in support of the proposed risk assessment process for Bees. Office of Chemical Safety and Pollution Prevention. Docket number EPA-HQ-OPP-2012-0543-0004, date September 2012
- ・ Anonymous (2020): NTP Research report on the scoping review of potential human health effects associated with exposure to neonicotinoid pesticides. US Department of Health and Human Services, dated September 2020
- ・ EPA (2004): Pesticide Fact Sheet: Dinotefuran, dated September 2004
- ・ EPA (2011a): Registration Review: Problem formulation for environmental fate, ecological risk, endangered species, and drinking water exposure assessments for dinotefuran. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0005, dated December 2011
- ・ EPA (2011b): Dinotefuran summary document registration review: Initial docket December 2011. Case number 7441. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920, dated January 2020
- ・ EPA (2012a): Guidance for considering and using open literature toxicity studies to support human health risk assessment. Office of Pesticide Programs, U.S. Environmental Protection Agency
- ・ EPA (2012b): Dinotefuran: Human health risk assessment for proposed section 3 uses on rice and food/feed handling establishments, and new horse Spot-On and Total Release Fogger Products. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0903-0005, dated August 2012
- ・ EPA (2016): Office of pesticide programs' framework for incorporating human epidemiologic & incident data in risk assessments for pesticides. Office of Pesticide Programs, U.S. Environmental Protection Agency
- ・ EPA (2017a): Draft assessment of the potential effects of dinotefuran on bees. Docket number

- EPA-HQ-OPP-2011-0920-0014, dated January 2017
- EPA (2017b): Preliminary ecological risk assessment (excluding terrestrial invertebrates) for the registration review of dinotefuran. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0616, dated November 2017
 - EPA (2017c): Dinotefuran: Registration review drinking water assessment. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0615, dated June 2017
 - EPA (2017d): Preliminary ecological risk assessment (excluding terrestrial invertebrates) for the registration review of dinotefuran. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0616, dated November 2017
 - EPA (2017e): Dinotefuran: Human health draft risk assessment for registration review. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0620, dated September 2017
 - EPA (2017f): Dinotefuran: Occupational and residential exposure assessment for registration review. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0621, dated September 2017
 - EPA (2017g): Response to public comments submitted on the Environmental Protection Agency's proposal to mitigate exposure to bees from acutely toxic pesticide products. Docket number EPA-HQ-OPP-2014-0818-0478, January 2017
 - EPA (2019): Open literature review summary of Raby et al. (2018) [chronic] toxicity data. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0865-1168, dated July 2019
 - EPA (2020a): Dinotefuran: Proposed interim registration review decision. Case number 7441. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920, dated January 2020
 - EPA (2020b): Comparative analysis of aquatic invertebrate risk quotients generated for neonicotinoids using Raby et al. (2018) toxicity data. Docket number EPA-HQ-OPP-2008-0844-1623, dated January 2020
 - EPA (2020c): Attachment 2 to the neonicotinoid final bee risk assessments. Residue bridging analysis of foliar and soil agricultural uses of neonicotinoids. Docket number EPA-HQ-OPP-2008-0844-1628, dated January 2020
 - EPA (2020d): Attachment 3 to the neonicotinoid final bee risk assessments. Residue bridging analysis for foliar and soil non-agricultural uses of neonicotinoids. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0581-0376, January 2020
 - EPA (2020e): EFED response to public comments common to the preliminary bee and preliminary non-pollinator registration review risk assessments across the four neonicotinoid pesticides (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, and dinotefuran). Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0581-0373, dated January 2020
 - EPA (2020f): Final bee risk assessment to support the registration review of dinotefuran. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0761, dated January 2020
 - EPA (2020g): Response to comments regarding the draft bee and non-bee ecological risk assessments for the registration review of dinotefuran. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0762, dated January 2020
 - EPA (2017h): Dinotefuran: Tier I update review of human incidents and epidemiology for draft risk assessment. Docket number EPA-HQ-OPP-2011-0920-0619, dated July 2017
 - FAO/WHO (2012): Summary report from the 2012 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR)

3.1 ヒトにおける知見

3.1.1 疫学研究

提出された疫学研究に該当する文献について、ジノテフランへの暴露と健康影響との関連について検討した。

健康関連の事象（疾病等）との関連が検討された主な文献は、腎尿細管機能不全 1 報、思春期早発症 1 報、子宮内胎児発育不全 1 報及び歯周病 1 報であった。

また、ジノテフラン暴露の把握方法としては、生体試料（尿、歯又は血液）中の濃度が 4 報であった。

① 腎尿細管機能不全との関連

原因不明の慢性腎疾患が増加しているスリランカの北中部乾燥地帯の 2 地域において、2015 年に慢性腎臓病患者 15 人、その健康な家族 15 人及び健康な近隣住民 62 人を対象に、尿中ジノテフラン濃度と神経心理学的症状等との関連が記述研究により検討された。

ジノテフランは、尿検体の 17.4%から検出された。クレアチニン補正後の尿中ジノテフラン濃度に有意差は認められなかった。指の振戦を訴えた対象者は 13 人（14.3%）で、尿中ジノテフラン濃度が有意に高く、慢性腎臓病患者が有意に多かった。腎尿細管バイオマーカーである尿中シスタチン C 濃度が高いグループ（ $> 70 \mu\text{g/gCre}$ ）と定量限界未満のグループでは、正常濃度のグループに比べてクレアチニン補正後の尿中ジノテフラン濃度が有意に高く、ジノテフランが腎尿細管機能障害のリスク因子の一つである可能性が示唆された。

本研究は、サンプルサイズが小さいこと、参加者の農薬暴露履歴が十分に調査されていないこと、対照の地域が設定されていないことの限界があると考えられた。（資料 51）

② 思春期早発症との関連

韓国ソウル特別市のセヴェランス小児病院において、2015 年 12 月～2017 年 1 月に患児群として思春期早発症患者女児 30 人と、対照群として正常思春期前女児 30 人を対象とした症例対照研究が実施された。それら女児の臨床特性（年齢、身長、体重、BMI、黄体形成ホルモン値、卵胞刺激ホルモン値、エストラジオール値、骨年齢）及びジノテフランを含む 320 種の農薬の尿中濃度が評価された。

患児群のうち 1 人（3.3%）、対照群のうち 2 人（6.7%）でジノテフランが検出され、統計学的有意差は認められなかった。本研究では、農薬と思春期

早発症に深い関連は認められなかった。

本研究は、症例及び対照群の選定過程において選択バイアスが生じた可能性があること、サンプルサイズが小さいこと等の限界があると考えられた。(資料 52)

③ 胎児発育不全との関連

中国広西チワン族自治区において実施された出生コホートの参加者のうち、2015 年 8 月～2018 年 12 月の研究期間に、自然妊娠で、妊娠 13 週までに妊婦健診を受け、空腹時の血液が採取され、正期産で出産した妊婦とその新生児のペア 1,483 組（胎児発育不全³児 387 組、及び 1 対 3 でマッチングされた正常児 1,096 組）を対象に、血清中ジノテフラン濃度と胎児発育不全との関連がコホート内症例対照研究により検討された。

母親の年齢、妊娠前の BMI、妊娠中の身体活動、受動喫煙、妊娠合併症、児の性別、他のネオニコチノイド系農薬等について調整が行われたところ、ジノテフラン暴露と胎児発育不全との間に正の関連が認められた（オッズ比⁴ : 1.93、95%CI : 1.69～2.20）。

本研究は、妊娠中の測定が 1 回のみであったこと、残余交絡の可能性があること等の限界があると考えられた。(資料 53)

④ 歯周病との関連

中国において、2019 年 5～10 月に虫歯でない第 3 大臼歯が収集された歯周病患者群 71 人及び歯周病のない対照群 56 人を対象に、第 3 大臼歯中の農薬濃度と歯周病との関連が症例対照研究により検討された。

第 3 大臼歯中のジノテフランの濃度と歯周病との間に有意な正の関連は認められなかった（年齢・性別調整後オッズ比 : 0.89、95%CI : 0.77～1.59、trend $p>0.05$ ）。

本研究には、サンプルサイズが大きくないことの限界があると考えられた。(資料 54)

これらの疫学研究のうち、一部の研究では、ジノテフラン暴露と事象（疾病等）との間に統計学的に有意な正の関連が認められたが、暴露量の推定において用いられている情報が限定的であること、同一の事象（疾病等）についての研究が複数存在せず結果の一致性を確認できないこと等の理由から、いずれの事象（疾病等）についても、ジノテフラン暴露との明確な関連を示

³ 新生児体重が、中国における同一妊娠週数での出生児体重の 10 パーセンタイル未満

⁴ ジノテフラン濃度の自然対数の 1 標準偏差増加当たりのオッズ比

す科学的知見は不十分であると判断した。

3.1.2 その他の情報（バイオモニタリング）

ヒトにおける動態及びバイオモニタリング研究の論文として、トキシコキネティクス関連 1 報を含む 5 報についてその概要を表 8 にまとめた。まとめるにあたり、欧州食品安全機関（EFSA）で採用されているバイオモニタリング試験の信頼性評価基準^{5,6}に基づき信頼性を評価し、スコアー2 以下を目安として採用した。

提出された論文はいずれも、ヒトにおける尿中濃度等の測定又はトキシコキネティクス解析を目的としたものであり、健康事象との関連は報告されていなかった。また、個々の被験者について実際の暴露量と健康影響との関係性を評価できる情報は得られなかったことから、現時点では報告された健康事象（3.1.1）と統合して AOEL 又は AAOEL の設定に資する解析を行うことは困難であると考えられた。

⁵ EFSA PPR Panel, 2017. Scientific Opinion of the PPR Panel on the follow-up of the findings of the External Scientific Report ‘Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects’. EFSA Journal 15(10), 5007, 101 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5007>

⁶ RPA, HSL, IEH, 2017. Human biomonitoring data collection from occupational exposure to pesticides - Final Report, EFSA supporting publication 2017:EN-1185. 207pp

表 8 ジノテフランのヒトにおける動態研究

研究	被験者	分析試料	報告された有効成分及び代謝物に関するデータ
Osaka, et al. (2016) (資料 63)	都市郊外在住小児 223 人 (3 歳；男児 108 人、 女児 115 人) (日本)	・尿試料 (夏期(2012)及び 冬期(2013)に尿を 採取)	・ジノテフランの検出率は 57.8% ・尿中濃度：ジノテフラン ：3.11 µg/g クレアチニン (中央値) ：25.66 µg/g クレアチニン (95%ile 値) ・EFSA 信頼性基準スコア：2
Ueyama, et al. (2015) (資料 64)	都市在住成人 17～20 人/年、 計 95 人 (45～75 歳；女性) (日本)	・尿試料 (1994、2000、 2003、2009、2011 年 に採取)	・ジノテフランは 2003 年、2009 年及び 2011 年に検出された。 ・尿中濃度：ジノテフラン (2003 年) ：<LOD (中央値) ：0.2 µg/g クレアチニン (90%ile 値) (2009 年) ：0.5 µg/g クレアチニン (中央値) ：10.2 µg/g クレアチニン (90%ile 値) (2011 年) ：1.8 µg/g クレアチニン (中央値) ：14.0 µg/g クレアチニン (90%ile 値) ・EFSA 信頼性基準スコア：2
Oya, et al. (201) (資料 65)	都市郊外在住小児 1,036 名(16-23 か月、 男児 530 人、女児 506 人) (日本)	・尿試料 (紙おむつ中に蓄 尿した尿を採取)	・ジノテフランの検出率は 45.8% ・尿中濃度：ジノテフラン ：< LOD (中央値) ：38.8 µg/g クレアチニン (95%ile 値) ・EFSA 信頼性基準スコア：2
Ueyama, et al. (2014) (資料 66)	都市在住成人 52 人 (男性 41 人、女 性 11 人、平均年齢 40.9 歳、非職業暴露) (日本)	・尿試料 (早朝尿)	・ジノテフランの検出率は 100% ・尿中濃度：ジノテフラン ：2.3 µg/L (中央値) ：18.3 µg/L (95%ile 値) ・EFSA 信頼性基準スコア：2
Harada, et al. (2016) (資料 67)	①成人 9 人 (標識体単回経口投 与し、尿中濃度を測 定。推移から薬物動 態モデルのパラメー タを算出。) ②成人 12 人 (マイクロドーズ試 験でモデルを検証) ③成人 373 人 (TK モデルを用い た一般日本人集団に よるジノテフランの 食品からの摂取量を 評価) (日本)	①尿試料 (標識体単回経口 投与 (5µg/人) 後 24 時間ごとに尿を 4 日 間採取) ②尿試料 (①で作成したモ デルの検証のため、 尿中の代謝物を分 析) ③尿試料 (尿中濃度からジ ノテフランの食品 からの摂取量を推 定)	・投与後 96 時間でジノテフラン (未変 化体) の 92.8%が尿中に排泄。 ・尿中排泄量：ジノテフラン ：1.02 µg/日 (中央値) ：8.63 µg/日 (90%ile 値) ・24 時間ごとの尿中排泄量の推移から、 ジノテフランについて 1 コンパートメン ト排泄動態モデルでパラメータを導出 r = 0.899 r は摂取量のうち未変化体として尿中 に排泄される割合を示し、ジノテフラン の大部分が未変化体として尿中に排泄 されることが示された。 ・日本人成人 373 人の尿中濃度から、ジ ノテフランの平均 1 日摂取量は 3.66 µg/ 日と推定され、最大推定摂取量 64.5 µg/ 日も ADI の 1%未満であった。 ・EFSA 信頼性基準スコア：2

Ⅲ. 農薬使用者暴露許容量 (AOEL)

急性毒性試験、28 日間反復経皮投与毒性試験及び 28 日間反復吸入毒性試験の結果において、経皮又は吸入経路特異的な毒性は見られなかったこと及び農薬としての使用方法から、ジノテフランの農薬使用者暴露許容量 (AOEL) の設定に当たっては、経皮又は吸入経路特異的な毒性を考慮する必要はないと判断した。また、疫学研究については、ジノテフランの農薬使用を通じた暴露を適切に特定し健康影響との関連を評価できる知見は得られなかった。よって経口投与による短期毒性試験、生殖・発生毒性試験及び神経毒性試験の結果に基づき AOEL を設定する (表 10)。

イヌを用いた 90 日間反復経口投与毒性試験において、雌の 58 mg/kg 体重/日投与群で認められた体重増加抑制等により、雌の無毒性量が設定できなかった (58 mg/kg 体重/日未満) が、より低用量で長期間実施されたイヌを用いた 1 年間反復経口投与毒性試験では、雌の無毒性量として 22 mg/kg 体重/日が得られている。

各試験で得られたジノテフランの無毒性量のうち最小値は、イヌを用いた 1 年間反復経口投与毒性試験の雌における体重増加抑制に基づく無毒性量 22 mg/kg 体重/日であったことから、これを AOEL の設定根拠とすることが妥当と判断した。

また、最小の無毒性量に近い投与量におけるラットを用いた動物代謝試験の経口吸収率は、胆汁中排泄試験の 50 mg/kg 体重投与群の 97.4~98.0% であり (表 9)、80%を超えることから、AOEL の設定に当たっては、経口吸収率による補正は必要ないと判断した。

表 9 ジノテフランを単回経口投与した場合の経口吸収率 (%)

投与量	50 mg/kg体重		200 mg/kg体重		1,000 mg/kg体重	
性別	雄	雌	雄	雌	雄	雌
経口吸収率 (%)	98.0	97.4	98.7	101	93.0	95.0
総回収率 (%)	99.5	99.2	102	104	94.7	98.8

表の値は 50 mg/kg 体重投与群は 4 匹、それ以外は 3 匹の平均値

以上の結果から、イヌを用いた 1 年間反復経口投与毒性試験の無毒性量 22 mg/kg 体重/日を安全係数 100 で除した 0.22 mg/kg 体重/日を農薬使用者暴露許容量 (AOEL) と設定した。

AOEL

0.22 mg/kg 体重/日

(AOEL 設定根拠試験)

1 年間反復経口投与毒性試験

(動物種)

イヌ

(期間)

1 年間

(投与方法)

混餌

(無毒性量)

22 mg/kg 体重/日

(毒性所見)

雌：体重増加抑制

(安全係数)

100

(経口吸収率)

補正しない

表 10 AOEL の設定に関連する毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	NOAEL (mg/kg 体重/ 日)	LOAEL (mg/kg 体重/ 日)	AOEL 設定に関連する エンドポイント*
ラット	90 日間 反復経口 投与毒性 GLP (資料 11)	0, 500, 5,000, 25,000, 50,000 ppm 雄 : 0, 34, 336, 1,620, 3,160 雌 : 0, 38, 384, 1,870, 3,620	雄 : 336 雌 : 38	雄 : 1,620 雌 : 384	雌雄 : 体重増加抑制及び摂餌量減少
	2 世代 繁殖毒性① GLP (資料 32)	0, 300, 1,000, 3,000, 10,000 ppm P 雄 : 0, 24.1, 79.9, 241, 822 P 雌 : 0, 26.8, 90.1, 268, 907 F ₁ 雄 : 0, 27.2, 90.5, 269, 935 F ₁ 雌 : 0, 29.6, 96.5, 293, 1,000	親動物及び児動物 P 雄 : 241 P 雌 : 268 F ₁ 雄 : 269 F ₁ 雌 : 293	親動物及び児動物 P 雄 : 822 P 雌 : 907 F ₁ 雄 : 935 F ₁ 雌 : 1,000	親動物及び児動物 雌雄 : 体重増加抑制等 繁殖能に対する影響は認められなかった。
	2 世代 繁殖毒性② GLP (資料 30)	0, 200, 2,000, 20,000 ppm P 雄 : 0, 16.2, 164, 1,690 P 雌 : 0, 18.4, 190, 1,840 F ₁ 雄 : 0, 21.4, 210, 2,170 F ₁ 雌 : 0, 21.9, 220, 2,230	親動物及び児動物 P 雄 : 164 P 雌 : 190 F ₁ 雄 : 210 F ₁ 雌 : 220	親動物及び児動物 P 雄 : 1,690 P 雌 : 1,840 F ₁ 雄 : 2,170 F ₁ 雌 : 2,230	親動物及び児動物 雌雄 : 体重増加抑制等 繁殖能に対する影響は認められなかった。
	2 世代 繁殖毒性③ 非 GLP (資料 31)	0, 2,000, 20,000 ppm P 雄 : 0, 147, 1,390 P 雌 : 0, 180, 1,690 F ₁ 雄 : 0, 198, 2,040 F ₁ 雌 : 0, 211, 2,180	親動物及び児動物 P 雄 : 147 P 雌 : 180 F ₁ 雄 : 198 F ₁ 雌 : 211	親動物及び児動物 P 雄 : 1,390 P 雌 : 1,690 F ₁ 雄 : 2,040 F ₁ 雌 : 2,180	親動物及び児動物 雌雄 : 体重増加抑制等 繁殖能に対する影響は認められなかった。
	発生毒性 GLP (資料 34)	0, 100, 300, 1,000 (妊娠 6～15 日投与)	母動物 : 300 胎 児 : 1,000	母動物 : 1,000 胎 児 : —	母動物 : 体重増加抑制等 胎児 : 毒性所見なし 催奇形性は認められなかった。
	90 日間 反復経口 投与神経 毒性 GLP (資料 42)	0, 500, 5,000, 50,000 ppm 雄 : 0, 33, 327, 3,410 雌 : 0, 40, 400, 3,810	雄 : 327 雌 : 400	雄 : 3,410 雌 : 3,810	雌雄 : 体重増加抑制等 神経毒性は認められなかった。
	発達神経 毒性 GLP (資料 43)	0, 1,000, 3,000, 10,000 ppm 妊娠期間 : 0, 79.4, 237, 784 哺育期間(0～13 日) : 0, 158, 501, 1,640 哺育期間(0～21 日) : 0, 188, 576, 1,930	母動物 : 237 児動物 : 784	母動物 : 784 児動物 : —	母動物 : 体重増加抑制(妊娠期間) 児動物 : 毒性所見なし 発達神経毒性は認められなかった。
マウス	90 日間 反復経口 投与毒性 GLP (資料 13)	0, 500, 5,000, 25,000, 50,000 ppm 雄 : 0, 81, 844, 4,440, 10,600 雌 : 0, 102, 1,060, 5,410, 11,600	雄 : 4,440 雌 : 5,410	雄 : 10,600 雌 : 11,600	雌雄 : 体重増加抑制等

ウサギ	発生毒性① GLP (資料 39)	0、60、175、500 (妊娠 6～27 日投与)	母動物：175 胎 児：500	母動物：500 胎 児：－	母動物：体重減少等 胎児：毒性所見なし 催奇形性は認められなかった。
	発生毒性② GLP (資料 36)	0、52、125、300 (妊娠 6～18 日投与)	母動物：52 胎 児：300	母動物：125 胎 児：－	母動物：体重増加抑制等 胎児：毒性所見なし 催奇形性は認められなかった。
イヌ	90 日間 反復経口 投与毒性 GLP (資料 15)	0、1,600、8,000、24,000 ^a ppm 雄：0、58、307、862 雌：0、58、323、950	雄：307 雌：－	雄：862 雌：58	雌雄：体重増加抑制等
	1 年間 反復経口 投与毒性 GLP (資料 18)	0、640、3,200、16,000 ppm 雄：0、20、111、559 雌：0、22、108、512	雄：559 雌：22	雄：－ 雌：108	雄：毒性所見なし 雌：体重増加抑制

*：最小毒性量で認められた主な毒性所見を示す。

－：無毒性量又は最小毒性量は設定できなかった。

a：最高用量群については、忌避による摂餌量の減少が認められたため、投与初日から 4 日目までは 40,000 ppm、5～11 日目は 30,000 ppm、12 日目からは 24,000 ppm と投与濃度を漸減した。

IV. 急性農薬使用者暴露許容量 (AAOEL)

ジノテフランの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響（表 11）に対する無毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験②の無毒性量 125 mg/kg 体重/日であり、得られた毒性所見を検討した結果、これを AAOEL の設定根拠とすることが妥当と判断した。

また、最小の無毒性量に近い投与量におけるラットを用いた動物代謝試験の経口吸収率は、胆汁中排泄試験の 200 mg/kg 体重投与群（雄）の 98.7～101% であった（表 9）。当該投与群は雄のみであったが、ほかの動物代謝試験の結果において供試動物の性別による顕著な違いは認められないことから、この投与量における経口吸収率は 80%以上であると考え、AAOEL の設定に当たっては、経口吸収率による補正は必要ないと判断した。

以上の結果から、ウサギを用いた発生毒性試験②の無毒性量 125 mg/kg 体重/日を根拠として、AOEL と同様に経口吸収率による補正は必要ないと判断し、安全係数 100 で除した 1.3 mg/kg 体重を急性農薬使用者暴露許容量 (AAOEL) と設定した。

AAOEL

1.3 mg/kg 体重

(AAOEL 設定根拠試験)	発生毒性試験②
(動物種)	ウサギ
(期間)	妊娠 6～18 日
(投与方法)	強制経口
(無毒性量)	125 mg/kg 体重/日
(毒性所見)	母動物：自発運動低下、振戦等
(安全係数)	100
(経口吸収率)	補正しない

表 11 AAOEL の設定に関連する毒性影響等

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)	無毒性量及び AAOEL に関連する エンドポイント* (mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日)
ラット	急性経口毒性 GLP (資料 4)	雄：1,000、2,000、3,000、5,000 雌：1,000、2,000、3,000、4,000	雌雄：－ 雄：顔面痲皮 雌：顔面赤色汚染
	一般薬理 (体温) 非 GLP (資料 47)	雄：0、550、850、1,300、2,000	雄：550 雄：体温低下
	一般薬理 (瞳孔径) 非 GLP (資料 47)	雄：0、850、1,300、2,000	雄：850 雄：縮瞳
マウス	急性経口毒性 GLP (資料 5)	1,000、2,000、3,000	雌雄：1,000 雌雄：自発運動低下、振戦等
	一般薬理 (一般状態) 非 GLP (資料 47)	0、550、850、1,300、2,000、2,600	雌雄：550 雌雄：自発運動低下等
	一般薬理 (自発運動量) 非 GLP (資料 47)	0、850、1,300、2,000	雌雄：1,300 雌雄：自発運動量減少
ウサギ	発生毒性① GLP (資料 39)	0、60、175、500	母動物：175 母動物：呼吸促迫
	発生毒性② GLP (資料 36)	0、52、125、300	母動物：125 母動物：自発運動低下、振戦等

－：無毒性量は設定されなかった。

*：最小毒性量又は最小作用量で認められた主な毒性所見を示す。

V. 暴露量の推計

1. 経皮吸収試験

(1) 経皮吸収率の推定

(ア) ^{14}C 標識ジノテフランを用いた *in vitro* 経皮吸収試験 (資料55、GLP)

調製方法：非標識ジノテフランに ^{14}C ジノテフランを添加し、さらに製剤白試料と混合して200 g ai/kg のジノテフラン製剤を調製した。製剤が固体であるため、適切に皮膚に適用できるよう同量の水を加えてペースト状に調製した (製剤)。 ^{14}C ジノテフランに製剤白試料及び水を混合して0.0667 g ai/L になるように調製した (3,000倍希釈液)。

採取試料：レセプターチャンバーにレセプター液を満たし、その上部にヒトの皮膚試料を接触させて、上記の製剤及び3,000倍希釈液を皮膚試料の表面に均一に適用した。処理8時間後に皮膚表面を洗浄し、表面に残存する放射性物質を回収した。処理24時間後に皮膚試料を採取し、テープにより角質層中の放射性物質を回収し (テープストリップ)、その濃度及び回収率等を測定した。また、レセプター液を経時的に採取し、皮膚を透過した放射性物質の濃度を測定した。

試験例数：製剤及び希釈液のいずれも、皮膚の健全性の基準 (経皮電気抵抗性 (TEER) $>7.7 \text{ k}\Omega$) を満たした8例で試験が実施された。

試験結果：ジノテフラン水溶剤を用いた経皮吸収試験の結果の概要を表12に示す。

表12：製剤及び3,000倍希釈液の経皮吸収

	製剤		3,000倍希釈液 (1:3,000)	
皮膚試料数	8		8	
設定濃度 [mg/mL]	200 [g/kg]		0.0667 [g/L]	
設定投与量 [$\mu\text{g}/\text{cm}^2$]	1,000		0.667	
平均実投与量 [$\mu\text{g}/\text{cm}^2$]	1,087		0.722	
回収率 [%]	平均	SD	平均	SD
<u>吸収率から除外可能な量</u>				
8、24時間後の皮膚試料洗浄液	93.81	2.73	90.75	3.60
ドナーチャンバー洗浄液	0.17	0.40	0.18	0.18
<u>皮膚試料に関連する量</u>				
テープストリップ1-2	0.01	0.00	0.05	0.03
テープストリップ3-20	0.05	0.02	1.72	0.69
皮膚試料中残渣量	0.16	0.05	1.69	0.63
<u>吸収量</u>				
レセプター液	0.05	0.04	0.88	0.39
レセプターチャンバー洗浄液	0.01	0.00	0.05	0.03
総回収率	94.26	2.43	95.30	3.24
試料採取期間の半分の期間における 透過率($t_{0.5}$) の信頼下限値(LLC of $t_{0.5}$)	26.49	13.86	43.32	17.71
吸収は完全か否か	いいえ		いいえ	
$t_{0.5} \leq 75\%$ のときの吸収量	0.27	0.09	4.33	0.87
$t_{0.5} > 75\%$ のときの吸収量	N/A	N/A	N/A	N/A
補正吸収量	0.27	0.09	4.33	0.87
最終吸収量	0.342		5.058	
最終吸収量(丸め値)	0.34		5.1	

BfR の経皮吸収率計算シートで解析

N/A：実施せず

ラット *in vitro* 経皮吸収率の推定結果

^{14}C 標識ジノテフランを用いた *in vitro* 経皮吸収試験結果を農薬使用者への影響評価ガイダンスに基づき評価した結果、以下のように提出されたジノテフラン水溶剤の経皮吸収率を推定した。

① 角質層中残渣量（テープストリップ）

製剤及び 3,000 倍希釈液について、試料採取期間は 24 時間であり、被験物質処理後 12 時間のレセプター液への透過率の信頼下限値 (LLC of $t_{0.5}$) は 75 %未満であったことから、2 番目までのテープストリップ由来の被験物質を経皮吸収量から除外し、3 番目以降のテープストリップ由来の被験物質を経皮吸収量として加えて経皮吸収率を算出した。

② 試験の回収率による補正

製剤の試料は 8 例で平均回収率が 95%未満（94.26%）であった。一

部の試料の回収率が 95%未満であったため、95%以上の適切な回収率が得られた 2 試料（セル 2 及び 5）と 95%未満の回収率の低かった 6 試料（セル 1、3、4、6、7 及び 8）の試験結果を比較し、回収できなかった被験物質が吸収されなかったと判断した。

3,000 倍希釈液は平均回収率が 95%以上であったことから、回収率による各吸収率の補正は行わなかった。

③ サンプル間の変動

製剤及び 3,000 倍希釈液の皮膚試料数はいずれも 8 であったことから、係数 0.84 を標準偏差に乘じ平均値に加算して経皮吸収率を算出した。その結果、製剤は 0.342%、3,000 倍希釈液は 5.058%であった。

以上から、本試験に用いたジノテフラン水溶剤（200 g ai/kg 製剤）の経皮吸収率は 0.34%、3,000 倍希釈液の経皮吸収率は 5.1%と推定した。

また、試験製剤は顆粒水溶剤のため、固体製剤と判断した。

（イ）暴露評価に用いる経皮吸収率

① スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、ホクコースタークル顆粒水溶剤及び三井東圧アルバリン顆粒水溶剤

申請されたスタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、ホクコースタークル顆粒水溶剤及び三井東圧アルバリン水溶剤（ジノテフラン 20.0% 水溶剤）は経皮吸収試験に用いた製剤と組成が同じであることから、ジノテフランのリスク評価に用いる経皮吸収率は農薬使用者への影響評価ガイドランスに基づき、表 13 のとおり適用する。

表 13：暴露評価に用いる経皮吸収率

申請された使用方法における希釈倍数	暴露評価に用いる経皮吸収率 (%)	算出根拠
製剤 (1倍)	0.34	経皮吸収試験の製剤の経皮吸収率を利用。
50倍	5.1	経皮吸収試験の3,000倍希釈液の経皮吸収率を利用。
100倍		
400倍		
1,000倍		
2,000倍		
3,000倍		

② キックオフ顆粒水和剤

申請されたキックオフ顆粒水和剤（クロラントラニリプロール 4.0%・ジノテフラン 15.0%水和剤）は経皮吸収試験に用いた製剤と異なる組成で

あることから、試験に用いた製剤と申請製剤であるキックオフ顆粒水和剤の皮膚刺激性、皮膚感作性及び剤型の比較を表 14 に示す（資料 56～59、GLP）。

申請製剤の皮膚刺激性及び皮膚感作性が試験製剤と同等であること及び申請製剤の剤型が試験製剤の剤型と同等であることから、農薬使用者への影響評価ガイダンスに基づき、ジノテフラン水溶剤（200 g ai/kg 製剤）を用いたジノテフランの経皮吸収試験の結果を本剤の経皮吸収率の推定に利用できると判断した。

表 14：試験製剤と本剤の皮膚刺激性、皮膚感作性及び剤型

試験	試験製剤	申請製剤
	区分	区分
皮膚刺激性	区分外	区分外
皮膚感作性	区分外	区分外
剤型	固体製剤	固体製剤

キックオフ顆粒水和剤のジノテフランのリスク評価に用いる経皮吸収率は、農薬使用者への影響評価ガイダンスに基づき、表 15 のとおり推定した。

なお、申請製剤は経皮吸収試験に用いた製剤よりも有効成分含有量が少ないことから、経皮吸収試験の製剤の試験結果を用いることができない。このため、製剤の経皮吸収率は固体製剤のデフォルト値（製剤 10%）を利用することが適当であると判断した。

表 15：暴露評価に用いる経皮吸収率

申請された使用方法における希釈倍数	暴露評価に用いる経皮吸収率(%)	算出根拠
製剤（1倍）	10	固体製剤のデフォルト値を利用。
100倍	5.1	経皮吸収試験の3,000倍希釈液の経皮吸収率を利用。
2,000倍		

③ スケルカット顆粒水和剤及びスケルノック顆粒水和剤

申請されたスケルカット顆粒水和剤及びスケルノック顆粒水和剤（ジノテフラン 40.0%水和剤）は経皮吸収試験に用いた製剤と異なる組成であることから、試験に用いた製剤と申請製剤であるスケルカット顆粒水和剤及びスケルノック顆粒水和剤の皮膚刺激性、皮膚感作性及び剤型の比較を表 16 に示す（資料 56、57、60、61、GLP）。

申請製剤の皮膚刺激性及び皮膚感作性が試験製剤と同等であること及び申請製剤の剤型が試験製剤の剤型と同等であることから、農薬使用者へ

の影響評価ガイダンスに基づき、ジノテフラン水溶剤（200 g ai/kg 製剤）を用いたジノテフランの経皮吸収試験の結果を本剤の経皮吸収率の推定に利用できると判断した。

表 16：試験製剤と本剤の皮膚刺激性、皮膚感作性及び剤型

試験	試験製剤	申請製剤
	区分	区分
皮膚刺激性	区分外	区分外
皮膚感作性	区分外	区分外
剤型	固体製剤	固体製剤

スケルカット顆粒水和剤及びスケルノック顆粒水和剤のジノテフランのリスク評価に用いる経皮吸収率は、農薬使用者への影響評価ガイダンスに基づき、表 17 のとおり推定した。

表 17：暴露評価に用いる経皮吸収率

申請された使用方法における希釈倍数	暴露評価に用いる経皮吸収率 (%)	算出根拠
製剤 (1倍)	0.34	経皮吸収試験の製剤の経皮吸収率を利用。
2,000倍	5.1	経皮吸収試験の3,000倍希釈液の経皮吸収率を利用。

④ オールスターズプレー

申請されたオールスターズプレー（ジノテフラン 0.010%液剤）は経皮吸収試験に用いた製剤を水で希釈した製剤であるため、ジノテフラン水溶剤（200 g ai/kg 製剤）を用いた経皮吸収試験の結果を本剤の経皮吸収率の推定に利用できると判断した。

オールスターズプレーのジノテフランのリスク評価に用いる経皮吸収率は、農薬使用者への影響評価ガイダンスに基づき、表 18 のとおり推定した。

表 18：暴露評価に用いる経皮吸収率

申請された使用方法における希釈倍数	暴露評価に用いる経皮吸収率 (%)	算出根拠
製剤 (1倍)	5.1	経皮吸収試験の3,000倍希釈液の経皮吸収率を利用。

⑤ その他の製剤

①～④以外の製剤のリスク評価に用いる経皮吸収率は、農薬使用者への影響評価ガイダンスに基づき、剤型によるデフォルト値を適用する。

2. 圃場における農薬使用者暴露

ジノテフランを含有する農薬製剤で実施した圃場における農薬使用者暴露試験結果は提出されていない。

3. 暴露量の推計

申請された製剤について、Ⅰ. の5. 適用病虫害雑草等の範囲及び使用方法（別添1）に従って使用した場合の暴露量を予測式により推計した。

推計に当たっては、農薬使用者への影響評価ガイダンス及び予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方（令和4年12月1日農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会決定、令和6年10月24日最終改訂）（以下「部会決定」という。）に準拠した。

推計に用いたパラメータ等及び暴露量の推計結果を別添2に示す。

Ⅵ. リスク評価結果

Ⅰ. の5. 適用病虫害雑草等の範囲及び使用方法（別添1）に従って使用した場合の暴露量は、AOEL 及び AAOEL を下回っていた（別添2）。

評価資料

資料 番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無
1	2024	農薬評価書 ジノテフラン（第7版） 食品安全委員会、公表 URL : https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20221214231&fileId=210
2	2000	Metabolism of [¹⁴ C]MTI-446 in Rats GLP、未公表
3	2000	MTI-446 の代謝研究 ¹⁴ C 標識ジノテフランを用いたラット体内における代謝試験-2 非 GLP、未公表
4	1997	Acute Oral Toxicity Study of MTI-446 in Rats GLP、未公表
5	1997	Acute Oral Toxicity Study of MTI-446 in Mice GLP、未公表
6	1997	Acute Dermal Toxicity Study of MTI-446 in Rats GLP、未公表
7	1999	MTI-446: Acute Inhalation (Nose-Only) Toxicity Study in the Rat GLP、未公表
8	1997	Dermal Sensitization Study of MTI-446 in Guinea Pigs - Maximization Test GLP、未公表
9	1998	Primary Dermal Irritation Study of MTI-446 in Rabbits GLP、未公表
10	1998	Primary Eye Irritation Study of MTI-446 in Rabbits GLP、未公表
11	1997	13-Week Dietary Toxicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
12	1997	4-Week Dietary Toxicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
13	1997	13-Week Dietary Toxicity Study with MTI-446 in Mice GLP、未公表
14	1997	4-Week Dietary Toxicity Study with MTI-446 in Mice GLP、未公表
15	1999	13-Week Dietary Toxicity Study with MTI-446 in Dogs GLP、未公表
16	1998	MTI-446のイヌにおける強制経口投与による1週間反復投与毒性試験 非 GLP、未公表
17	1998	MTI-446のイヌにおける混餌投与による1週間反復投与毒性試験 非 GLP、未公表
18	1999	52-Week Dietary Chronic Toxicity Study with MTI-446 in Dogs GLP、未公表
19	2002	MTI-446: 28 Day Inhalation (nose-only) Toxicity Study in the Rat GLP、未公表
20	2003	MTI-446: 6 Day Inhalation (Nose-only) Toxicity Study in the Rat GLP、未公表

資料 番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無
21	2001	28-Day Dermal Toxicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
22	2001	14-Day Range-Finding Dermal Toxicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
23	1996	MTI-446の細菌を用いる復帰突然変異試験 GLP、未公表
24	1996	MTI-446 の in vitro 哺乳動物細胞遺伝学的試験 GLP、未公表
25	1995	MTI-446のマウスを用いる小核試験 GLP、未公表
26	2002	MTI-446 Technical Material: Mutation at the Thymidine Kinase (tk) Locus of Mouse Lymphoma L5178Y Cells (MLA) using the Microtitre ^R Fluctuation Technique GLP、未公表
27	1996	MTI-446の細菌を用いるDNA修復試験 GLP、未公表
28	2000	104-Week Dietary Combined Chronic Toxicity and Carcinogenicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
29	2000	78-Week Dietary Carcinogenicity Study with MTI-446 in Mice GLP、未公表
30	2000	MTI-446のラットにおける混餌経口投与による2世代繁殖試験 GLP、未公表
31	2000	MTI-446のラットにおける混餌経口投与による二世代繁殖試験追加試験 非 GLP、未公表
32	2002	MTI-446: Two-Generation Reproduction Study in the Han Wistar Rat by Oral (dietary) Administration GLP、未公表
33	2001	MTI-446 Technical Preliminary Two Generation Study in the Han Wistar Rat GLP、未公表
34	1998	MTI-446のラットにおける強制経口投与による催奇形性試験 GLP、未公表
35	1998	MTI-446のラットにおける強制経口投与による催奇形性試験のための用量設定試験 非 GLP、未公表
36	1998	MTI-446のウサギにおける強制経口投与による催奇形性試験 GLP、未公表
37	1998	MTI-446のウサギにおける単回および2週間反復強制経口投与による予備試験 非 GLP、未公表
38	1998	MTI-446のウサギにおける強制経口投与による催奇形性試験のための用量設定試験 非 GLP、未公表
39	2013	Dinotefuran: Prenatal Developmental Toxicity Study in Rabbits GLP、未公表
40	2012	Dinotefuran: Preliminary Prenatal developmental toxicity Study in Rabbits 非 GLP、未公表

資料 番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無
41	2001	Acute Oral Gavage Neurotoxicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
42	2001	13-Week Dietary Neurotoxicity Study with MTI-446 in Rats GLP、未公表
43	2010	Oral (Diet) Developmental Neurotoxicity Study of MTI-446 (Dinotefuran) in Crl:CD(SD) Rats GLP、未公表
44	2009	Oral (Diet) Dosage-Range Finding Developmental Neurotoxicity and Immunotoxicity Study of MTI-446 (Dinotefuran) in Crl:CD(SD) Rats GLP、未公表
45	2011	Dinotefuran: 4 Week Dietary Immunotoxicity Study in the CD Rat GLP、未公表
46	2011	Dinotefuran: 4 Week Dietary Immunotoxicity Study in the CD-1 Mouse GLP、未公表
47	1999	MTI-446の生体機能に及ぼす影響に関する試験 非 GLP、未公表
48	2024	ジノテフラン公表文献報告書 URL : https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/saihyoka/attach/pdf/saihyouka_sa-3.pdf
49	2024	ジノテフラン公表文献報告書（追補） URL : https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/saihyoka/attach/pdf/saihyouka_sa-4.pdf
50	2024	公表文献に関する情報募集（令和6年5月9日～令和6年6月7日）で寄せられた情報 URL : https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/saihyoka/attach/pdf/saihyouka_sa-2.pdf
51	2021	Taira K <i>et al</i> : Urinary concentrations of neonicotinoid insecticides were related to renal tubular dysfunction and neuropsychological complaints in Dry-zone of Sri Lanka: Scientific Reports. 2021; 11:22484.
52	2020	Suh J <i>et al</i> : Effect of agricultural pesticide on precocious puberty in urban children: an exploratory study: Clinical and Experimental Pediatrics. 2020; 63(4) 146-150.
53	2023	Pan D <i>et al</i> : Maternal exposure to neonicotinoid insecticides and fetal growth restriction: A nested case-control study in the Guangxi Zhuang birth cohort: Chemosphere. 2023; 336:139217.
54	2021	Zhang N <i>et al</i> : Occurrence of neonicotinoid insecticides and their metabolites in tooth samples collected from south China: Associations with periodontitis: Chemosphere. 2021; 264:128498.
55	2021	The <i>In Vitro</i> Percutaneous Absorption of Radiolabelled Dinotefuran in a 20% Water-Soluble Granule (SG) Formulation and a Single In-Use Dilutions Through Human Split-Thickness Skin (OECD 428) GLP、未公表
56	1999	MTI-446 水溶剤（顆粒）のウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 GLP、未公表
57	1999	MTI-446 水溶剤（顆粒）のモルモットを用いた皮膚感作性試験（Buehler Test） GLP、未公表

資料 番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無
58	2009	ジノテフラン 15% クロラントラニリプロール 4%水和剤のウサギを用いる皮膚 刺激性試験 GLP、未公表
59	2009	ジノテフラン 15% クロラントラニリプロール 4%水和剤のモルモットを用いる 皮膚感作性試験（Buehler 法） GLP、未公表
60	2003	MTI-446 水和剤のウサギを用いた皮膚刺激性試験 GLP、未公表
61	2003	MTI-446 水和剤のモルモットを用いた皮膚感作性試験（Buehler Test 法） GLP、未公表
62	2022	ジノテフランの試験成績の概要及び考察 未公表
63	2016	Osaka A, Ueyama J, Kondo T, Nomura H, Sugiura Y, Saito I et al. Exposure characterization of three major insecticide lines in urine of young children in Japan- neonicotinoids, organophosphates, and pyrethroids. Environmental Research. 2016; 147, 89-96
64	2015	Ueyama J, Harada KH, Koizumi A, Sugiura Y, Kondo T, Saito I et al. Temporal levels of urinary neonicotinoid and dialkylphosphate concentrations in Japanese women between 1994 and 2011. Environmental Science & Technology.2015; 49 (24), 14522-14528
65	2021	Oya N, Ito Y, Ebara T, Kato S, Ueyama J, Aoi A et al. Cumulative exposure assessment of neonicotinoids and an investigation into their intake-related factors in young children in Japan. Science of The Total Environment. 2021; 750
66	2014	Ueyama J, Nomura H, Kondo T, Saito I, Ito Y, Osaka A et al. Biological monitoring method for urinary neonicotinoid insecticides using LC-MS/MS and its application to Japanese adults. Journal of Occupational Health. 2014; 56 (6), 461-468
67	2016	Harada KH, Tanaka K, Sakamoto H, Imanaka M, Niisoe T, Hitomi T et al. Biological Monitoring of Human Exposure to Neonicotinoids Using Urine Samples, and Neonicotinoid Excretion Kinetics. PLoS One. 2016; 11(1): e0146335.

別添 1：適用病害虫雑草等の範囲及び使用方法（ジノテフラン）

目 次

1. 登録番号 20805：スタークル粒剤、 登録番号 20806：アルバリン粒剤、 登録番号 20807：ホクコースタークル粒剤、 登録番号 20959：三井東圧アルバリン粒剤、 登録番号 22738：スターガード粒剤 （ジノテフラン 1.0 %粒剤）	5
2. 登録番号 20808：スタークル箱粒剤、 登録番号 20960：三井東圧アルバリン箱粒剤 （ジノテフラン 2.0 %粒剤）	14
3. 登録番号 20811：スタークル顆粒水溶剤、 登録番号 20812：アルバリン顆粒水溶剤、 登録番号 20813：ホクコースタークル顆粒水溶剤、 登録番号 20961：三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 （ジノテフラン 20.0 %水溶剤）	15
4. 登録番号 20814：スタークル粉剤 DL、 登録番号 20815：アルバリン粉剤 DL、 登録番号 20816：ホクコースタークル粉剤 DL、 登録番号 20962：三井東圧アルバリン粉剤 DL （ジノテフラン 0.50 %粉剤）	25
5. 登録番号 20836：スタークルトレボン粉剤 DL （エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤）	26
6. 登録番号 21025：ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL （ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤）	26
7. 登録番号 21027：ビームスタークル粉剤 5 DL （ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤）	26
8. 登録番号 21191：ビームバシスタークル粉剤 5 DL （ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤）	27
9. 登録番号 21248：スタークル L 粉剤 DL、 登録番号 21435：スタークルメイト L 粉剤 DL （ジノテフラン 0.35 %粉剤）	27
10. 登録番号 21259：スタークル液剤 10、 登録番号 21260：スタークルメイト液剤 10、 登録番号 24582：アルバリン液剤 10 （ジノテフラン 10.0 %液剤）	28

1 1. 登録番号 21276 : スタークル1 キロ H 粒剤、 登録番号 21277 : スタークルメイト1 キロ H 粒剤 (ジノテフラン 3.0 %粒剤)	35
1 2. 登録番号 21497 : ホクコービルダースタークル箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)	35
1 3. 登録番号 21607 : スタークルエアー50、 登録番号 21608 : スタークルメイトエアー50、 登録番号 24012 : ファームスター顆粒水溶剤 50 (ジノテフラン 50.0 %水溶剤)	35
1 4. 登録番号 21710 : ホクコーラブサイドスタークルフロアブル (ジノテフラン 5.0 %・フサライド 12.0 %水和剤)	36
1 5. 登録番号 21801 : ワイドナーエース粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライド 2.5 %・フル トラニル 2.0 %粉剤)	36
1 6. 登録番号 21871 : コラトップスタークル1 キロ粒剤 (ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)	37
1 7. 登録番号 21886 : イモチエーススタークル粒剤、 登録番号 21888 : ホクコーイモチエーススタークル粒剤 (ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)	37
1 8. 登録番号 21975 : トレボンスター粉剤 DL (エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)	37
1 9. 登録番号 22036 : ビームエイトスタークルゾル (ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)	38
2 0. 登録番号 22037 : トレボンスターフロアブル (エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)	38
2 1. 登録番号 22063 : 日農ビームアプロードスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	39
2 2. 登録番号 22102 : ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)	39
2 3. 登録番号 22130 : わさび用緑風 SG (ジノテフラン 20.0 %水溶剤)	39
2 4. 登録番号 22268 : ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)	40
2 5. 登録番号 22332 : スタークル豆つぶ、 登録番号 22333 : クミアイスタークル豆つぶ、 登録番号 22495 : スタークルメイト豆つぶ (ジノテフラン 12.0 %剤)	40

2 6. 登録番号 22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、 登録番号 23950 : オリザエートスター箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %粒剤)	40
2 7. 登録番号 22479 : ダブルカットスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	41
2 8. 登録番号 22642 : ホクコートトップジンスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・チオファネートメチル 2.0 %粉剤)	41
2 9. 登録番号 22725 : キックオフ顆粒水和剤 (クロラントラニリプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)	42
3 0. 登録番号 22924 : ホクコートトップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン 5.0 %・チオファネートメチル 20.0 %水和剤)	44
3 1. 登録番号 22981 : ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL (ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)	44
3 2. 登録番号 22995 : ダブルカットスタークルフロアブル (ジノテフラン 10.0 %・カスガマイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)	45
3 3. 登録番号 23074 : アトラクトン箱粒剤、 登録番号 23075 : スターダム箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %粒剤)	45
3 4. 登録番号 23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、 登録番号 23078 : ロングリーチ箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)	46
3 5. 登録番号 23113 : イッカツエース粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)	46
3 6. 登録番号 23365 : フェルテラスタークル箱粒剤 CU (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)	47
3 7. 登録番号 23370 : スケルカット顆粒水和剤、 登録番号 23371 : スケルノック顆粒水和剤 (ジノテフラン 40.0 %水和剤)	47
3 8. 登録番号 23372 : スターガードプラス AL (ジノテフラン 0.010 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)	48
3 9. 登録番号 23405 : トライスタークル粉剤 DL、 登録番号 23407 : クミアイトライスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)	50
4 0. 登録番号 23506 : オールスタースプレー (ジノテフラン 0.010 %液剤)	51

4 1. 登録番号 23624 : ウッドスター (ジノテフラン 8.0 %液剤)	55
4 2. 登録番号 23676 : ウッドセーバー (ジノテフラン 8.0 %液剤)	56
4 3. 登録番号 23685 : ハイポネックス原液 殺虫剤入り (ジノテフラン 2.5 %複合肥料)	56
4 4. 登録番号 23705 : サンプラススタークル箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)	56
4 5. 登録番号 23706 : ガッツスター粒剤、 登録番号 23707 : ゴウケツモンスター粒剤 (ジノテフラン 1.67 %・シメコナゾール 1.5 %・トルプロカルブ 3.0 %粒剤)	57
4 6. 登録番号 23833 : ハイパーキック箱粒剤、 登録番号 23834 : ゴウケツバスター箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)	57
4 7. 登録番号 23840 : サンフェスタ箱粒剤 (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %・トルプロカルブ 4.0 %粒剤)	58
4 8. 登録番号 24316 : アースガーデン 4 (エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン 0.00050 %・ペンチオ ピラド 0.010 %水和剤)	59
4 9. 登録番号 24344 : スタートレボン W10 (エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)	60
5 0. 登録番号 24347 : ブレードスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)	61
5 1. 登録番号 24413 : マグァンプ K 殺虫剤入り (ジノテフラン 0.20 %複合肥料)	61
5 2. 登録番号 24530 : オーケストラスタークルエアー (ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサン 10.0 %水和剤)	62
5 3. 登録番号 24608 : ブレードスタークル R ゾル (ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)	62

1. 登録番号 20805 : スタークル粒剤、
 登録番号 20806 : アルバリン粒剤、
 登録番号 20807 : ホクコースタークル粒剤、
 登録番号 20959 : 三井東圧アルバリン粒剤、
 登録番号 22738 : スターガード粒剤
 (ジノテフラン 1.0 %粒剤)

(1) スタークル粒剤、アルバリン粒剤、ホクコースタークル粒剤及び三井東圧アルバリン粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
稲	ウカ類 ツグロコバイ コメテウイ イトメイシ カミシ類 イヌゾウムシ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び1条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
きゅうり	ハダニ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
	ハダニ類 アザミヤ類		定植時		植穴土壌混和		
	コジラミ類	1~2g/株	育苗期		株元散布		3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類		生育期 但し、収穫開始 14日前まで				
	コジラミ類 アブラムシ類	1~2g/株				植穴土壌混和	
			定植時				
うり類 (漬物用)	アザミヤ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和		
	アブラムシ類 コジラミ類	1~2g/株					
メロン	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
		定植時	植穴土壌混和				
	コジラミ類	1~2g/株	育苗期		株元散布		
		定植時	植穴土壌混和				
	ハダニ類		育苗期		株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
	アザミヤ類		定植時		植穴土壌混和		
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	定植時		植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
			生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布		
			育苗期				
かぼちゃ	アブラムシ類 コジラミ類		定植時		植穴土壌混和		3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌漑は合計1回以内、散布は2回以内)
にがうり	コジラミ類						3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメチアザノを含む農薬の総使用回数
ズッキーニ	コジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 定植後の株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	
なす	ハダカアザミ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、散 布及び定植後の株元散布は合計 2回以内)
	ハダカアザミ類 アザミ類	1~2g/株	定植時		植穴土壌混和	
	コジラミ類		育苗期	株元散布		
	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴土壌混和		
	コジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、収穫前日 まで	2回以内	株元散布	
ピーマン	アザミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫前日 まで	2回以内	株元散布	
			育苗期	1回		
トマト ミニトマト	コジラミ類	培土1L 当り 10g	は種前		1回	培土混和
	ハダカアザミ類 コジラミ類	1~2g/株	定植時	植穴土壌混和		
			育苗期	2回以内	株元散布	
	コジラミ類	1g/株	生育期 但し、収穫前日 まで			
	アブラムシ類		定植時	1回	植穴土壌混和	
とうがらし類	アザミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	
			育苗期			
	コジラミ類					
とうがらし(葉)	アザミ類 アブラムシ類		定植時 但し、収穫30 日前まで		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメチアザンを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の 土壌混和及び灌漑は合計1回 以内、散布及び無人航空機散 布は合計2回以内)
	アオシ コガ	2~3g/株	定植時		植穴土壌混和	
	ハマダラメカ	3g/株				
はくさい	アブラムシ類	2g/株				3回以内(定植時の土壌 混和及び灌漑は合計 1回以内、散布及び無人 航空機散布は合計 2回以内)
	アオシ コガ	2~3g/株				
	ハマダラメカ	3g/株				
ブロッコリー	アブラムシ類 コガ	2g/株				3回以内 (定植時の土壌混和及び灌漑は 合計1回以内、 散布及び無人航空機散布は合 計2回以内)
ねぎ	アザミヤ類 ハダカリハエ類	6kg/10a	は種時		播溝土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへ の灌漑及び定植時の株元散布 は合計1回以内、生育期の株 元灌漑は1回以内、散布、 無人航空機散布及び定植後の 株元散布は合計2回以内)
			定植時		株元散布	
	アザミヤ類 クロハネコバエ類	6~9kg/10a	生育期 但し、収穫3日 前まで	2回以内		
	ハダカリハエ類					
わけぎ	アザミヤ類 ハダカリハエ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫21 日前まで	1回		4回以内 (定植後の株元散布は1回以 内、生育期の株元灌漑は 1回以内、散布は2回以内)
らっきょう	アザミヤ類 ハダカリハエ類		生育期 但し、収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
にんじん	ハダカリハエ類	9kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和は1回以 内、生育期の株元灌漑は 1回以内、散布は2回以内)
セリ	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以 内、散布は2回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジメアノを含む 農薬の総使用回数	
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回 以内、は種時の全面土壌混和は 1回以内、粒剤の散布は1回以 内、水溶剤の散布、液剤の散布 及び無人航空機散布は合計2 回以内)	
	キジノミムシ	4-6kg/10a			全面土壌混和		
		9~12kg/10a			散布		
		6kg/10a					
タネバエ							
チンゲンサイ	キジノミムシ	6kg/10a	定植時		土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土 壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	
非結球あぶら な科葉菜類 (チンゲンサイを除 く)	アブラムシ類 キジノミムシ		は種時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)	
							かぶ
							ほうれんそう
レタス 非結球レタス	ハモグリバエ				培土1L 当り 15g 1g/株	は種前 育苗期後半	培土混和 株元散布
	アブラムシ類 ハモグリバエ	2g/株	定植時		植穴土壌混和		
	しゅんぎく	ハモグリバエ類	9kg/10a		は種時	播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)
定植時					植溝土壌混和		
					植穴土壌混和		
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株				植穴土壌混和	1回
かんきつ (苗木)	カンハモグリガ	20g/株	育苗期		5回以内	株元散布	5回以内
なし (苗木)	アブラムシ類	20g/株 (但し、10a 当 り 110kg ま で)	育苗期	1回	株元散布	1回	
くわい	アブラムシ類	3kg/10a	収穫30 日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
ふき		20kg/10a	定植後～ 生育期 (草丈20cm 頃 まで) 但し、収穫45 日前まで	1回	土壌表面散布	3回以内 (土壌表面散布は1回以内、 散布は2回以内)	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の総使用回数
しょうが	クハバネノコバエ類	9kg/10a	生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元散布	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
オクラ	アブラムシ類		生育期 但し、収穫開始14日前まで			
さやいんげん さやえんどう 実えんどう	ハダカトリバエ類					
だいず えだまめ	アブラムシ類	6kg/10a	播種時		播種時土壌混和	3回以内 (播種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
さとうきび	カバノコバネノコバエ類	6-9kg/10a	生育期 但し、収穫45日前まで	2回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
	メダカトリバエ類	9kg/10a				
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	播種時	1回	全面土壌混和	2回以内 (播種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)
			生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布	
しそ	アブラムシ類	2g/株 (但し、10a 当り 25kg まで)	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
食用ぎく	アブラムシ類	1g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		20kg/10a	生育期 但し、収穫前日まで	3回以内	株元散布	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内)
	マメコバネノコバエ	2g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
茶	アブラムシ類	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
きく ガーベラ	マメコバネノコバエ	2g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	コバネノコバエ類 アブラムシ類	1g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)				
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
花き類・ 観葉植物 (きく、 ガーベラを除く)	コバネノコバエ類 アブラムシ類	1g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
つつじ類	アブラムシ類	6kg/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
いぐさ	アブラムシ類	3-4kg/10a				

(2) スターガード粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノフェンを含む 農薬の総使用回数
きゅうり	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2 g/株			株元散布	
		1 g/株	生育期 但し、 収穫開始 14 日前まで			
メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2 g/株	定植時		植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	アブラムシ類	1 g/株				
	コナジラミ類	1~2 g/株				
すいか	ワタアブラムシ	2 g/株	生育期 但し、収穫 21 日前まで		株元散布	4 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
なす	ハモグリバエ類 アザミウマ類	1~2 g/株	定植時			2 回 以内
	コナジラミ類	1 g/株	生育期 但し、 収穫前日まで			
	アブラムシ類					
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類	1~2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	5 回以内 (培土混和及び灌注は 合計 1 回以内、育苗期の 株元散布は 1 回以内、 定植時の土壌混和は 1 回以内、散布及び定植 後の株元散布は 合計 2 回以内)
	コナジラミ類		1 g/株	生育期 但し、 収穫前日まで	2 回 以内	
	アブラムシ類	定植時		1 回		

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフエンを含む農薬の総使用回数	
ピーマン	アザミウマ類	1~2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 2 回以内)	
	アブラムシ類	1 g/株		2 回以内	株元散布		
とうがらし類	アザミウマ類	1~2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)	
	アブラムシ類	1 g/株	生育期 但し、 収穫開始 14 日前まで		株元散布		
キャベツ	アブラムシ類	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)	
	アオムシ コナガ	2~3 g/株					
	ハイマダラノメイガ	3 g/株					
はくさい	アブラムシ類	2 g/株				植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計 1 回以内、散布は 2 回以内)
	アオムシ コナガ	2~3 g/株					
	ハイマダラノメイガ	3 g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2 g/株	定植時			株元散布	3 回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6 g/m ²	生育期 但し、 収穫 3 日前 まで	2 回以内			
にんじん	ハモグリバエ類	9 g/m ²	は種時	1 回	播溝 土壌混和	4 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、生育期の株元灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内)	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメテランを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	6 g/m ²	は種時	1 回	播溝 土壌混和	5 回以内 (は種時の播溝土壌混和は 1 回以内、 は種時の全面土壌混和は 1 回以内、 粒剤の散布は 1 回以内、 水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)
	キスジノミハムシ	4~6 g/m ²			全面 土壌混和	
		9 g/m ²			散布	
		6 g/m ²	生育期 但し、 収穫 30 日前 まで			
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6 g/m ²	定植時	1 回	土壌混和	3 回以内 (は種時及び定植時の土 壌混和は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
非結球あぶら な科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類 キスジノミハムシ		は種時		播溝 土壌混和	3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回 以内)
かぶ						3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中 散布、無人航空機散布 は合計 2 回以内)
ほうれんそう	アブラムシ類					3 回以内 (は種時及び定植時の土 壌混和は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
だいず えだまめ	フタスジヒメハムシ					
しゅんぎく	ハモグリバエ類		9 g/m ²		定植時	植溝 土壌混和
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1 g/株		植穴 土壌混和		1 回
オクラ	アブラムシ類	9 g/m ²	生育期 但し、 収穫開始 14 日前まで	株元散布	3 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
さやえんどう	ハモグリバエ類					

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフエンを含む農薬の総使用回数
レタス	アブラムシ類 ナモグリハエ	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回以内、 育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
しそ	マデイロコナカイガラ ムシ	2 g/株 (但し、1 m ² 当り 25 g まで)				3 回以内 定植時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)
きく ガーベラ	マメハモグリハエ	2g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g まで)	定植時	1 回	植穴 土壌混和	5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)
	コナジラミ類 アブラムシ類	1 g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g まで)				
	花き類・ 観葉植物 (きく、ガーベ ラを除く)	アブラムシ類	20 g/m ²	生育期	5 回以 内	
1 g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g まで)			定植時	1 回	植穴 土壌混和	
		コナジラミ類				
つつじ類	ツツジゲンハイ	6 g/m ²	発生初期	5 回以 内	株元散布	5 回以内

2. 登録番号 20808 : スタークル箱粒剤、
登録番号 20960 : 三井東圧アルバリン箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミスジウメシ イネトヨイムシ イネコカメシ	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	は種前	1 回	育苗箱の 床土又は覆 土に均一に 混和する。	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本 田での散布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)
	は種時覆土前 ～ 移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する。			
	移植 3 日前 ～ 移植当日					

3. 登録番号 20811：スタークル顆粒水溶剤、
登録番号 20812：アルバリン顆粒水溶剤、
登録番号 20813：ホクコースタークル顆粒水溶剤、
登録番号 20961：三井東圧アルバリン顆粒水溶剤
(ジノテフラン 20.0 %水溶剤)

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数	
稲	—	カメシ類	2000 倍	60~150 L/10 a	収穫7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及 び側条施用は合計 1 回以内、本田での 散布、空中散布、無人 航空機散布は合計 3 回以内)	
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000 倍						
未成熟 とうもろこし		アブラムシ類 カメシ類	2000 倍	100~300 L/10 a	収穫前 日まで			2 回 以内	3 回以内
とうもろこし (子実)		ムギキレアブラムシ カメシ類							
ピーマン		アブラムシ類	3000 倍			3 回以内 (育苗期の株元散 布及び定植時の土 壌混和は合計 1 回 以内、散布及び 定植後の株元散布 は合計 2 回以内)			
		コナジラミ類	2000~ 3000 倍						
		アザミウマ類 カメシ類	2000 倍						
トマト ミニトマト		コナジラミ類	100 倍			化成型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60 cm・使用 土壌約 15~40 L) 当り 0.5L	鉢上時 又は 定植時	1 回	
			2000~ 3000 倍						
		カメシ類	2000 倍	100~300 L/10 a	収穫前 日まで	2 回 以内	散布		
なす		コナジラミ類	2000~ 3000 倍					3 回以内 (育苗期の株元散 布及び定植時の 土壌混和は合計 1 回以内、散布 及び定植後の株 元散布は合計 2 回以内)	
		アブラムシ類	3000 倍						
	アザミウマ類 カメシ類	2000 倍							

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数			
とうがらし類	—	アブラムシ類	3000 倍	100~300 L/10 a	収穫前 日まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元散 布及び定植時の土 壌混和は合計 1 回以内、 定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回 以内)			
とうがらし (葉)		コナジラミ類	2000~ 3000 倍		収穫 14 日前ま で			3 回以内 (定植時の 土壌混和は 1 回以内、 散布は 2 回 以内)			
		アブラムシ類	3000 倍								
		アザミウマ類	2000 倍								
かぼちゃ		コナジラミ類	2000 倍		セウロ型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊(30×60 cm・ 使用土壌 約 1.5~4.0L)当 り 0.5L			定植前日 ~ 定植時	1 回	灌注	3 回以内 (定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌水は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
		アブラムシ類									
		きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	2000~ 3000 倍		100~300 L/10 a	収穫 前日 まで				
アザミウマ類 ウリハムシ カメムシ類			2000 倍								
すいか		アブラムシ類	2000~ 3000 倍		収穫 7 日 前まで				4 回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計 1 回 以内、定植後の株元 散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)		

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
メロン	ー	コナジラミ類	2000~30 00倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計1回以内、 散布は2回以内)
		アブラムシ類	3000倍		収穫 前日 まで			3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は 2回以内)
アザミウマ類		2000倍	収穫 前日 まで					
コナジラミ類 アザミウマ類					2000~ 3000倍			収穫 前日 まで
アブラムシ類		3000倍	収穫 前日 まで					
コナジラミ類					2000倍			収穫 前日 まで
ズッキーニ		アブラムシ類	3000倍					
まくわうり		アブラムシ類 コナジラミ類			2000~ 3000倍			収穫 前日 まで
きゅうり(葉)			アブラムシ類 コナジラミ類					
きゅうり(花)		アブラムシ類		2000~ 3000倍	収穫 前日 まで	3回以内 (定植時の土壌 混和及び灌漑は 合計1回以内、 散布及び無人航空機散 布は合計2回以内)		
ブロッコリー			アブラムシ類				100倍	セリ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約1.5~4.0L)当り 0.5L
はくさい		アブラムシ類	2000~ 3000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌漑は合計1回 以内、散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
	キジナミシ ダニシ	2000倍						
キャベツ	ー	アブラムシ類	2000~ 3000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 灌漑は合計1回 以内、散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		アブラムシ類 コガ アムシ ハヤダラノメガ	50~ 100倍	セリ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約3L)当り 0.5L	定植前日 ~ 定植時	1回	灌注	

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
レタス 非結球レタス	—	アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100-300 L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (は種前の培土混和 は 1 回以内、 育苗期の株元散 布、定植時の土壌 混和及び育苗トレイ への灌注は合計 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)
		ハモンヨトウ	50 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約1.5-4.0L)当 り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注	
		アブラムシ類 マダガスカリア	50～ 100 倍					
非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイ、 畑わさびを 除く) かぶ		アブラムシ類	3000 倍	100-300 L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)
		キジノミハシ	2000 倍					
		アブラムシ類	3000 倍					
		キジノミハシ	2000 倍					
		アブラムシ類 ナベハシ						
		畑わさび						
		わさび			畑育 苗期	3 回 以内		3 回以内
だいこん		アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100-300 L/10a	収穫7 日 前まで	2 回 以内	散布	5回以内 (は種時の播種土壌混 和は1回以内、は種時 の全面土壌混和は1回 以内、粒剤の散布は 1回以内、水溶性の散 布、液剤の散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		ダイコンハシ	2000 倍					
		キジノミハシ	1000 倍					
	クルン	アブラムシ類	3000倍					

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
ねぎ	—	アザミヤカ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	2回 以内	散布	4回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び 定植時の株元散布は 合計1回以内、 生育期の株元灌注は 1回以内、散布、無人 航空機散布及び定植 後の株元散布は 合計2回以内)
		アザミヤカ類 ハモグリバエ類 シロイモリヨウ タネバエ ネギコガ	50倍	セリ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約1.5~4.0L) 当り0.5L	定植前日 ～ 定植時	1回	灌注	
		クハネネコバエ類	1000倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで		株元 灌注	
		アザミヤカ類						
		ハモグリバエ類 トビイロヨウゾウムシ	400倍	0.4L/m ²				
たまねぎ	—	アザミヤカ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時の灌注は1回以 内、 散布は3回以内)
		ハモグリバエ類	50倍	セリ成型育苗 トレイ1箱又は ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌約 1.5~4.0 L) 当り0.5 L	定植前日 ～ 定植時	1回	灌注	
にら	—	ネギアザミヤ	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで	1回	株元 灌注	3回以内 (生育期の株元 灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		ネギアザミヤ アブラムシ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫 前日まで	2回 以内	散布	
		クハネネコバエ類	1000倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで	1回	株元 灌注	
わけぎ	—	アザミヤカ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	2回 以内	散布	4回以内 (定植後の株元散布は 1回以内、生育期の株 元灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		アザミヤカ類 ハモグリバエ類	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで	1回	株元 灌注	

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
アスパカス	—	コジラミ類 アザミヤ類 カミシ類 ジュボノヒガハシ	2000倍	100~800 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
らっきょう		アザミヤ類		100~300 L/10a	収穫7日前 まで			(粒剤は2回以内、 液剤、水溶液及び水和 剤は合計3回以内)
さとうきび		アブラミ類 カンジャコバネガカミシ サトウハチバナアザミヤ				100~300 L/10a	収穫7日前 まで	
にんじん		アブラミ類	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、収穫 21日前まで			1回
		トビイロヨウタノザウル クハネネコハエ類						
セラー		アブラミ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫4日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布は 2回以内)
ほうれんそう	アブラミ類 ウリハミトキ	3000倍	収穫3日前 まで		3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布は 2回以内)			
しゅんぎく	アブラミ類		収穫前日 まで		3回以内 (は種時及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布は 2回以内)			
みつば	—	アブラミ類	3000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで 但し、伏 せ込み栽 培は伏せ 込み前ま で	2回 以内	散布	2回以内
だいず		カミシ類 ダイズサテハエ	2000倍		収穫7日 前まで			3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布、空中 散布、無人航空機散布 は合計2回以内)
		フタズビヒメハシ	3000倍					
あずき		アブラミ類						3回 以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数	
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやいんげ ん、さやえんどう、 実えんどう、未成熟さ げ、未成熟そら まめを除く)	—	アブラムシ類 ハダニ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	散布	2回以内	
えだまめ		カミシ類 ダイオウサバエ アブラムシ類 ハダニ類	3000倍		3回以内 (1回時の土壌混和は 1回以内、散布、空中 散布、無人航空機散布 は合計2回以内)				
		フタスズヒカミシ							
未成熟ささげ		アブラムシ類 ハダニ類	—					収穫前日 まで	3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
さやいんげん		アブラムシ類 ハダニ類 コジラミ類 カミシ類							
さやえんどう 実えんどう		アブラムシ類 ハダニ類 ウナギジミ カミシ類							
未成熟そらまめ	アブラムシ類 ハダニ類 カミシ類	2回以内							
しょうが	—	クハネ科ハダニ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)	
ワラ		アブラムシ類 フタスズヒカミシ			収穫7日 前まで			2回以内	
はらひしよ		ワカアブラムシ			収穫3日 前まで	1回		1回	
かんしよ		コジラミ類 アブラムシ類			収穫7日 前まで	3回 以内		3回以内	
せり	水田	アブラムシ類	—		2回 以内		3回以内 (土壌表面散布は 1回以内、 散布は2回以内)		
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設	アブラムシ類				収穫3日 前まで			
すいぜんじな	—	アブラムシ類				収穫3日 前まで		2回 以内	
モハヤ		アザミソバエ類				収穫前日 まで			
なんてん (葉)		アブラムシ類	収穫7日 前まで						
ふき	—	コジラミ類	—		—	収穫7日 前まで	—	—	—

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
りんご	—	アブラムシ類 モモハゲリガ シクムシ類 ギンモハゲリガ コカガラムシ類 カミシ類	2000倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
もも 初刈		アブラムシ類 モモハゲリガ シクムシ類 カミシ類 モクジョウジゾウムシ				2回 以内		2回以内
おうとう		オウトウヨウジヨウバエ カミシ類				3回 以内		3回以内
なし		アブラムシ類 シクムシ類 カミシ類 ケムシ類 コカガラムシ類 チュウゴクシジミ				4回以内 (塗布は 1回以内、散布 及び無人航空機 散布は合計 3回以内)		4回以内 (塗布は 1回以内、散布 及び無人航空機 散布は合計 3回以内)
かき		カミシ類 コカガラムシ類 タノハムシガ アザシメ類				3回 以内		3回以内
ぶどう	—	フタトヒメコバエ	3000倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内 (塗布は1回以内)
		カミシ類 ブドウカサシ	2000倍			2回 以内		2回以内
ラズベリー		チャキロアザシメ コカガラムシ類	1000~ 2000倍			3回 以内		3回以内
		アザシメ類	2000倍			3回 以内		3回以内
		チャキロアザシメ コカガラムシ類	1000~ 2000倍			3回 以内		3回以内
		ゴマダカサシ	1000倍			3回 以内		3回以内
かんきつ		アブラムシ類 シカンハゲリガ カミシ類 コアササメガ ゲキスバエ類 シカンバエ アカカガラムシ ヤノカガラムシ サンホセカガラムシ シカシジミ コシジミ類 チャミドリヒメコバエ アハバロト	2000倍			3回 以内		3回以内
小粒核果類		アブラムシ類 カミシ類 シクムシ類 モヒメコバエ						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジフルアソを含む農薬の 総使用回数
イチゴ	—	カビ類	1000~2000倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
マンゴー		チャレノアザミ	2000倍		収穫前日 まで	2回 以内		2回以内
びわ		カビ類 ビワジラミ						
あけび (果実)		カビ類						
かりん				収穫前日 まで				
かりん(葉)				収穫14日 前まで				
茶		チャノカ チャノミドリヒメコバイ チャレノアザミ ツグミ アカスミ コシノガサ	200~400 L/10a	摘採前日 前まで				
てんさい	—	アブラムシ類 テニシイモリハエ	2000~3000倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (灌水は1回以内、 散布は2回以内)
		カメノコハシ	1000~2000倍		移植前	1回		
		カメノコハシ テニシイモリハエ テニシイモリハシ	100~ 200倍	5L/ペーパー ポット6冊 (2.5L/m ²)				
		アブラムシ類 テニシイモリハエ テニシイモリハシ	100~ 240倍	6L/ペーパー ポット6冊(3 L/m ²)				
かんきつ (苗木)		シロハダカ	50倍	100mL/株	育苗期	5回 以内	株元 灌水	5回以内
えごま(種子)		カビ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	5回 以内	散布	5回以内
アマノハ(茎葉) しそ(花穂) しそ科葉菜類 (しそ、バジル を除く)		アブラムシ類	3000倍			2回 以内		2回以内
しそ		アブラムシ類 ウハシロトキ						3回以内 (定植時の土壌混和は1回 以内、散布は2回以内)
バジル しよくようほう ずき 食用ニバラ 食用カーネーション 食用パセリ 食用金魚草 食用トニア 食用なでしこ 食用グリンパ 食用オクラ 食用せんち こう		アブラムシ類 オゾラミ						2回以内
食用トモモ			収穫7日 前まで					

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数	
食用ぎく	—	アブラムシ類 コジロアミ類	3000倍	100-300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布及び株元 散布は合計3回以内)	
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)		アブラムシ類 コジロアミ類	2000～ 3000倍		発生 初期	5回 以内	散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)	
きく		ハダカバエ類	1000倍	1 L/m ²			灌注		
		アブラムシ類 コジロアミ類	2000～ 3000倍	100-300 L/10a			散布		
		カミシ類	2000倍				散布		
		ハダカバエ類	1000～ 2000倍	1 L/m ²			灌注		
樹木類 (つつじ類 つばき類を 除く)		カミシ類	2000倍	100-700 L/10a	発生 初期	5回 以内	散布	5回以内	
つつじ類		ツツジゲンバイ カミシ類		100-300 L/10a					
つばき類		カミシ類		100-700 L/10a				2回 以内	株元灌注
			チャドカス	100倍	0.5-2L/樹 【但し、220 L/10a まで】				
いぐさ			イグサシロムシガ	1000倍	100-150 L/10a	発生 初期	3回 以内	散布	2回以内
いよ科牧草			アブラムシ類	2000倍	100-300 L/10a	収穫7日 前まで		散布	3回以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
かき	コカカアミ類	20~40 g/樹	発芽前~ 発芽期	1回	本剤1g 当り水1mL の割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	4回以内 (塗布は1回以内、 散布及び無人航空機散布 は合計3回以内)
ぶどう	クビアカサシバ	40 g/樹	幼果期まで 但し、収穫30 日前まで			3回以内 (塗布は1回以内)

4. 登録番号 20814 : スタークル粉剤 DL、
 登録番号 20815 : アルバリン粉剤 DL、
 登録番号 20816 : ホクコースタークル粉剤 DL、
 登録番号 20962 : 三井東圧アルバリン粉剤 DL
 (ジノテフラン 0.50 %粉剤)

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 イナゴ類 イネトヨイムシ ニカメイチュウ フタホヒコヤカ	3 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)
だいず えだまめ	カメシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤマバエ			2 回 以内		3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計 2 回以内)

5. 登録番号 20836 : スタークルトレボン粉剤 DL

(エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 カメシ類 イナゴ類 ニカメイチュウ	3 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)

6. 登録番号 21025 : ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	3 回以内
	イナゴ類 ニカメイチュウ	4 kg/10 a					

7. 登録番号 21027 : ビームスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメシ類 イナゴ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)
	穂枯れ(ごま葉枯病菌)	4 kg/10 a					

8. 登録番号 21191 : ビームバシスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	メプロニルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメシ類 イナゴ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、本 田での散布、空中 散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)	3 回以内
	穂枯れ(ごま 葉枯病菌) 紋枯病	4 kg/10 a						

9. 登録番号 21248 : スタークル L 粉剤 DL、

登録番号 21435 : スタークルメイト L 粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以 内、 本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)
	カメシ類	3~4 kg/10 a				

10. 登録番号 21259 : スタークル液剤 10、
登録番号 21260 : スタークルメイト液剤 10、
登録番号 24582 : アルバリン液剤 10
(ジノテフラン 10.0 %液剤)

(1) スタークル液剤 10

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウカ類	30 倍	3L/10a	収穫7日 前まで	3回 以内	無人航空機 による散布	4回以内 (育苗箱への 処理及び側条施用 は合計1回以内、 本田での散布、空中 散布、無人航空機散 布は合計3回以内)
		16 倍	1.6L/10a			散布	
	ツマグロヨコバイ ウカ類 カミシ類	1000 倍	60~150 L/10a			無人航空機 による散布	
		300 倍	25L/10a			空中散布	
		8 倍	0.8L/10a				
		30 倍	3L/10a				
小麦	アブラムシ類	1000 倍	60~150 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	散布	2回以内
		8 倍	0.8 L/10 a			無人航 空機に よる散 布	
たいこん	アブラムシ類	8~16 倍	1.6L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	無人航空機 による散布	5回以内 (1)は種時の播種土 壌混和は1回以 内、(2)は種時の全面 土壌混和は1回 以内、 粒剤の散布は 1回以内、 水溶液の散布、 液剤の散布及び 無人航空機散布 は合計2回以内)
キャベツ							3回以内 (育苗期の株元散 布、定植時の土 壌混和及び灌水 は合計1回以内、 散布及び無人航 空機散布は合計 2回以内)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の 総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類	8~16 倍	1.6L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	無人航空機 による散布	3 回以内 (定植時の土壌昆 和及び灌水は合 計1 回以内、散布 及び無人航空機 散布は合計2 回 以内)
ねぎ	アザミ類	10~16 倍	1.6L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	無人航空機 による散布	4 回以内 (播種時の土壌昆 和、育苗トレイへの 灌水及び定植時 の株元散布は合 計1 回以内、生 育期の株元灌水 は1 回以内、 散布、無人航空 機散布及び定植 後の株元散布は 合計2 回以内)
さとうきび	カンヤコハ、ネガ、カミシ イゴ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫7 日 前まで	3 回 以内	散布	5 回以内 (剤液は2 回 以内、液剤、 水溶剤及び 水和剤は合計 3 回以内)
		14 倍	24 L/10a			無人航空機 による散布	
だいず えだまめ	カミシ類 フタズビカミシ ダイズサヤカバエ	1000 倍	100~300 L/10a		2 回 以内	散布	3 回以内 (播種時の土壌昆 和は1 回以内、 散布、空中散 布、無人航空機 散布は 合計2 回以内)
		8 倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布	
らっきょう	アザミ類 ハモグリバエ類		1.6L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	無人航空機 による散布	3 回以内
いね、牧草	アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫7 日 前まで		散布	

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の 総使用回数
かんしょ	アブラムシ類	8~16倍	1.6 L/10 a	収穫3 日 前まで	1回	無人航 空機に よる 散布	1回
はくさい					2回 以内		3回以内 (定植時の土 壌混和及び灌 注は合計1回 以内、散布及 び無人航空機 散布は合計 2回以内)
レタス 非結球レタス							4回以内 (は種前の培 土混和は1回 以内、育苗期 の株元散布、 定植時の土壌 混和及び育苗 トレイへの灌 注は合計1回以 内、散布及び 無人航空機散 布は合計2回 以内)
かき	かみシ類	20倍	8 L/10 a	収穫前 日まで	3回 以内		4回以内 (塗布は1回以 内、散布及び 無人航空機散 布は合計 3回以内)

(2) スタークルメイト液剤 10

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数	
稲	ウカ類	30 倍	3L/10a	収穫7 日 前まで	3 回 以内	無人航空機 による散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条施用 は合計1 回以内、 本田での散布、空中 散布、無人航空機散 布は合計3 回以内)	
		16 倍	1.6L/10a			散布		
	ツマグロヨコバイ	1000 倍	60~150 L/10a			無人航空機 による散布		
		300 倍	25L/10a			空中散布		
		ウカ類 カミシ類	8 倍			0.8L/10a		
			30 倍			3L/10a		
			小麦			アブラムシ類		1000 倍
8 倍	0.8 L/10 a	無人航 空機に よる散 布						
だいこん	アブラムシ類	8~16 倍	1.6L/10a		収穫3 日 前まで	2 回 以内	無人航空機 による散布	5 回以内 (は種時の播種土 壌混和は1 回以 内、は種時の全面 土壌混和は1 回 以内、 粒剤の散布は 1 回以内、 水溶剤の散布、 液剤の散布及び 無人航空機散布 は合計2 回以内)
キャベツ							3 回以内 (育苗期の株元散 布、定植時の土 壌混和及び灌水 は合計1 回以内、 散布及び無人航 空機散布は合計 2 回以内)	

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の 総使用回数		
ねぎ	アザミヤ類	10~16 倍	1.6L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	無人航空機 による散布	4 回以内 (1は種時の土壌混 和、育苗トレイへの 灌注及び定植時 の株元散布は合 計1 回以内、生 育期の株元灌注 は1 回以内、 散布、無人航空 機散布及び定植 後の株元散布は 合計2 回以内)		
さとうきび	カンヤコバ、ネカガカミシ イゴ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫7 日 前まで	3 回 以内	散布	5 回以内 (粒剤は2 回 以内、液剤、 水溶液及び 水和剤は合計 3 回以内)		
		14 倍	24 L/10a			無人航空機 による散布			
だいず えだまめ	カミシ類 フタズビカミシ ダイズサヤカバエ	1000 倍	100~300 L/10a		2 回 以内	散布	3 回以内 (1は種時の土壌混 和は1 回以内、 散布、空中散 布、無人航空機 散布は 合計2 回以内)		
		8 倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布			
						空中散布			
らっきょう	アザミヤ類 ハモグリバエ類	1000 倍	1.6L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	無人航空機 による散布	3 回以内		
いね科牧草	アブラムシ類		100~300 L/10a	収穫7 日 前まで		散布			

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の 総使用回数
かんしょ	アブラムシ類	8~16倍	1.6 L/10 a	収穫3日 前まで	1回	無人航 空機に よる 散布	1回
はくさい					2回 以内		3回以内 (定植時の土 壌混和及び灌 注は合計1回 以内、散布及 び無人航空機 散布は合計 2回以内)
レタス 非結球レタス							4回以内 (は種前の培 土混和は1回 以内、育苗期 の株元散布、 定植時の土壌 混和及び育苗 トレイへの灌 注は合計1回以 内、散布及び 無人航空機散 布は合計2回 以内)
かき	カメムシ類	20倍	8 L/10 a	収穫前 日まで	3回 以内		
そてつ	ソテツシロカイガラムシ	5倍	400~800 mL/株 (但し、40 L/10 aまで)	新葉展 開前	1回	株元灌注	5回以内

(3) アルバリン液剤 10

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍率	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジメチアトを含む 農薬の総使用回数	
小麦	アブラムシ類	8 倍	0.8 L/ 10 a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	無人航 空機に よる散 布	2 回以内	
だいこん	アブラムシ類	8~16 倍	1.6 L/10 a	収穫 7 日 前まで			5 回以内 (は種時の播溝土壌混和 は 1 回以内、は種時の全 面土壌混和は 1 回以内、 粒剤の散布は 1 回以内、 水溶剤の散布、液剤の散 布及び無人航空機散布は 合計 2 回以内)	
キャベツ				収穫 3 日 前まで			3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び灌 注は合計 1 回以内、散布 及び無人航空機散布は 合計 2 回以内)	
ブロッコリー							3 回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布及び無人航空機散布 は合計 2 回以内)	
ねぎ	アザミウマ類	10~16 倍	1.6 L/10 a	収穫 3 日 前まで			4 回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び 定植時の株元散布は合計 1 回以内、生育期の株元 灌注は 1 回以内、散布、 無人航空機散布及び定植 後の株元散布は合計 2 回以内)	
かんしょ	アブラムシ類	8~16 倍		1.6 L/10 a	収穫 3 日 前まで		1 回	1 回
はくさい							3 回 以内	3 回以内 (定植時の土壌混和及び灌 注は合計 1 回以内、散布及 び無人航空機散布は 合計 2 回以内)
レタス 非結球レタス								4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回 以内、育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は合計 1 回以内、散布及び無人航 空機散布は合計 2 回以内)
かき	カメムシ類	20 倍	8 L/10 a	収穫前日 まで	3 回 以内		4 回以内 (塗布は 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 3 回以内)	

1 1. 登録番号 21276 : スタークル 1 キロ H 粒剤、
登録番号 21277 : スタークルメイト 1 キロ H 粒剤
(ジノテフラン 3.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 イネミズゾウムシ ニカメイチュウ	1 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)
					無人航空機による散布	

1 2. 登録番号 21497 : ホクコービルダースタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネトヨイムシ ニカメイチュウ イネミズゾウムシ もみ枯細菌病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm) 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 3 日前~移植当日	1 回	育苗箱の苗の上から均一に散布する	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネコカメシ いもち病		緑化期~移植当日				

1 3. 登録番号 21607 : スタークルエアー50、
登録番号 21608 : スタークルメイトエアー50、
登録番号 24012 : ファームスター顆粒水溶剤 50
(ジノテフラン 50.0 %水溶剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	散布液量	使用 時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	カメシ類 ウンカ類	40 倍	0.8 L/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	無人ヘリコプターによる散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)
						空中散布	

1 4. 登録番号 21710 : ホクコーラブサイドスタークルフロアブル
(ジノテフラン 5.0 %・フサライド 12.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回 数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 カメシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	500 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、 本田での散布、 空中散布、無人ヘリ 散布は合計 3 回 以内)	3 回以内
	いもち病 カメシ類	150 倍	25 L/10 a			無人ヘリコ プターによ る散布		
	いもち病 カメシ類 ウンカ類	4 倍	0.8 L/10 a					
			原液			0.2 L/10 a		

1 5. 登録番号 21801 : ワイドナーエース粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライ
ド 2.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメシ類 コブノメイガ コメイチユ イネツトムシ フタホシコヤカ いもち病	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布

ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	テブフェノジドを 含む農薬の 総使用回数	ブプロフェジンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数	フルトラニルを 含む農薬の 総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以 内、本田での散布、空 中散布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内	4 回以内 (小包装投入 は 1 回以内)	3 回以内	3 回以内 (小包装投入 は 1 回以内)

1 6. 登録番号 21871：コラトップスタークル1 キロ粒剤
(ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	1 kg/10 a	出穂 5 日 前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は 合計 1 回以内、 本田での散布、 空中散布、無人航空 機散布は合計 3 回以内)	3 回以内 (直播では種 時又は移植時ま での処理は 1 回 以内、本田では 2 回以内)
					無人航空 機による 散布		

1 7. 登録番号 21886：イモチエーススタークル粒剤、
登録番号 21888：ホクコーイモチエーススタークル粒剤
(ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	メトミノストロビンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(アルタナリア菌) 変色米(カーブナリア菌) 墨黒穂病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類 フタオビコヤカ	3 kg/10 a	収穫 35 日 前まで	1 回	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及 び側条施用は合計 1 回以内、本田での 散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	1 回

1 8. 登録番号 21975：トレボンスター粉剤 DL
(エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ コブノメイカ フタオビコヤカ	4 kg/10 a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回 以内	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、 本田での散布、空 中散布、無人航空 機散布は 合計 3 回以内)
	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ						
だいず	カメムシ類 フタスジヒメハムシ	3~4 kg/10 a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内		2 回 以内	3 回以内 (は種時の土壌混 和は 1 回以内、散 布、空中散布、無 人航空機散布は 合計 2 回以内)

19. 登録番号 22036 : ビームエイトスタークルゾル

(ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合 計 1 回以内、本田 での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)
		250~300 倍	25 L/10 a					
		8 倍	0.8 L/10 a			無人ヘリコプ ターによる 散布		

20. 登録番号 22037 : トレボンスターフロアブル

(エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	カメシ類 ウンカ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ フタホヒコヤガ	1000 倍	60~ 150 L/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計 3 回以内)
	カメシ類	300 倍	25 L/10 a					
	カメシ類 ウンカ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ							
だいず	カメシ類	8 倍	0.8 L/10 a		2 回以内	無人航空 機による 散布	2 回以内	3 回以内 (は種時の土壌混 和は 1 回以内、 散布、空中散 布、無人航空機 散布は合計 2 回 以内)

2 1. 登録番号 22063 : 日農ビームアブロードスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ブプロフェジンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ いもち病	3~4 kg/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、空中 散布、無人ヘリ 散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (小包装投入は 1 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、 本田では 3 回以内)

2 2. 登録番号 22102 : ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	ペンシクロンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 21 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、本 田での散布、空中 散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)	4 回以内

2 3. 登録番号 22130 : わさび用緑風 SG

(ジノテフラン 20.0 %水溶剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
わさび	アブラムシ類 アザミウマ類	2000 倍	100~200 L/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内

2 4. 登録番号 22268 : ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	フルトラニルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前 まで	3 回以 内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以 内、本田での散布、空 中散布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本 田では 3 回以内)	3 回以内 (小包装投 入は 1 回以 内)

2 5. 登録番号 22332 : スタークル豆つぶ、

登録番号 22333 : クミアイスタークル豆つぶ、

登録番号 22495 : スタークルメイト豆つぶ

(ジノテフラン 12.0 %剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
稲	カメシ類 イネミズゾウムシ イネトヨイムシ	250 g/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以内、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 3 回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	250~500 g/10 a				

2 6. 登録番号 22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、

登録番号 23950 : オリザエートスター箱粒剤

(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 ウンカ類 イネミズゾウムシ イネトヨイムシ ツマグロヨコバイ コメイチュウ イネカメシ もみ枯細菌病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm 使用 土壌約 5 L)1 箱当 り 50 g	緑化期~ 移植当日	1 回	育苗箱の 苗の上か ら均一に 散布する。	4 回以内 (育苗箱への処 理及び側条施 用は合計 1 回 以内、本田での 散布、空中散 布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以 内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内)
	フタオビコヤガ		移植 3 日前~ 移植当日				

27. 登録番号 22479：ダブルカットスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	カスガマイシンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3~4 kg/10 a	穂揃 期 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本田 での散布、空 中散布、無人 ヘリ散布は合計 3 回以内)	4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内、育 苗箱への処 理は 1 回以 内、本田で は 2 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処 理は 1 回以 内、本田では 3 回以内)
	ニカメイチュウ イナゴ類	4 kg/10 a						

28. 登録番号 22642：ホクコートップジンスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・チオファネートメチル 2.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 紋枯病	3~4 kg/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	3回以内 (種子への処理は 1回以内)

29. 登録番号 22725 : キックオフ顆粒水和剤

(クロラントラニリプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロラントリアロールを 含む農薬の 総使用回数	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数
なし	カミシ類 コナカイラムシ類	2000 倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内	3 回以内
もも	シシイ類 カミシ類 ハマシ類 モモグサガ			2 回 以内	2 回以内			
初刈ン	カミシ類 カミシ類			3 回 以内	3 回以内			
うめ	カミシ類 カミシ類			3 回 以内	4 回以内 (塗布は 1 回以内、 散布及び無人航空 機散布は 合計 3 回以内)			
かき	コナカイラムシ類 カミシ類 カミシ類 アザシ類 カミシ類		100~300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内		4 回以内 (粒剤は 1 回 以内、水和剤 は 3 回以内)	5 回以内 (粒剤は 2 回以内、 液剤、水溶剤及び 水和剤は合計 3 回 以内)
さとうきび	カンショバネガミシ サウナシガ アザシ アザシ類 アザシ類 メダカシ ツバキ	収穫 30 日前 まで						
キャベツ	アザシ類 アザシ類 コガ アザシ ヨウモシ ハスモヨウ ハイダラノメガ	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊(30×60 cm・ 使用土壌 約 1.5~4.0L) 当り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注	4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の処理は 3 回以内)	3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和 及び灌注は合計 1 回 以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)
はくさい	アザシ類 コガ アザシ ヨウモシ ハイダラノメガ						3 回以内 (定植時の土壌混 和及び灌注は合計 1 回以内、散布及 び無人航空機散布 は合計 2 回以内)	
ブロッコリー	アザシ類 コガ アザシ ハスモヨウ ヒメダカ						3 回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計 1 回以内、散布及 び無人航空機散布は 合計 2 回以内)	

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロチアニゾールを 含む農薬の 総使用回数	ジメチアトールを含む 農薬の総使用回数
レタス	アブラムシ類 オオムシカ アゲハ類 ハダニ類 ハモグリバエ	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌 約15-40L) 当り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は1 回 以内、定植後 の処理は 3 回以内)	4 回以内 (は種前の培土混和 は1 回以内、育苗期 の株元散布、定植時 の土壌混和及び育苗 トレイへの灌注は合計 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計2 回以内)
非結球レタス							4 回以内 (灌注は1 回 以内、散布は 3 回以内)	
ねぎ	ハダニ類 アザミヤカ類 シロイロハダニ クハダニ類						4 回以内 (灌注は1 回 以内、定植後の 処理は3 回以内)	4 回以内 (は種時の土壌混 和、育苗トレイへの灌 注及び定植時の株元 散布は合計1 回以 内、生育期の株元灌 注は1 回以内、散 布、無人航空機散布 及び定植後の株元 散布は合計 2 回以内)

30. 登録番号 22924 : ホクコートップジンスタークルフロアブル

(ジノテフラン 5.0 %・チオファネートメチル 20.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 墨黒穂病 稲こうじ病 ウカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	500 倍	60~150 L/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、本 田での散布、空中 散布、無人航空機 散布は合計 3 回 以内)	3 回以内 (種子への処理は 1 回以内)
		150 倍	25 L/10 a					
	いもち病 紋枯病 カメムシ類 ウカ類	4 倍	0.8 L/10 a			無人航空 機による 散布		
		15 倍	3 L/10 a			空中 散布		

31. 登録番号 22981 : ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL

(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリ
ダマイシン 0.30 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	穂揃期 まで	2 回 以内	散布
	ニカメイチュウ	4 kg/10 a			

ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	カスガマイシンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施 用は合計 1 回以内、本田で の散布、空中散布、 無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内、育苗 箱への処理は 1 回以内、本 田では 2 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)	6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)

3 2. 登録番号 22995 : ダブルカットスタークルフロアブル

(ジノテフラン 10.0 %・カスガマイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	カスガマイシンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	穂揃期 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱へ の処理及 び側条施 用は合計 1 回以内、本 田での散 布、空中散 布、無人航 空機散布は 合計 3 回 以内)	4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内、 育苗箱への 処理は 1 回 以内、本田 では 2 回以 内)	4 回以内 (育苗箱への 処理は 1 回 以内、本田 では 3 回以 内)
		300 倍	25 L/10 a			無人航 空機に よる 散布			
		8 倍	800 mL/10 a			空中 散布			

3 3. 登録番号 23074 : アトラクトン箱粒剤、

登録番号 23075 : スターダム箱粒剤

(ジノテフラン 12.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植当日	1 回	育苗箱 の上から 均一に 散布す る。	4 回以内 (育苗箱への処理及 び側条施用は合計 1 回以内、本田での 散布、空中散布、 無人航空機散布は 合計 3 回以内)
		高密度には種する 場合は 1 kg/10 a (育苗箱(30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50~100 g)	移植 3 日前 ~ 移植当日			
	ウカ類 イナゴ類 イネミズゾウムシ イネトヨイムシ イネカサハエ フタホシコヤガ ニカメイチュウ	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g				

**3 4. 登録番号 23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、
登録番号 23078 : ロングリーチ箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)**

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 当日	1 回	育苗箱の 苗の上か ら均一に 散布する。	4 回以内 (育苗箱への 処理及び 側条施用は 合計 1 回以 内、本田での 散布、空中散 布、無人ヘリ散 布は合計 3 回 以内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回 以内)
	ウンカ類 イネスズムシ イネトヨイムシ ツマグロヨコバイ フタホシコヤカ イネカサバエ イナゴ類 いもち病		移植 3 日 前～移植当 日				

**3 5. 登録番号 23113 : イッカツエース粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシク
ラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)**

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 コブノメカ フタホシコヤカ ニカメイチュウ イネツトムシ	3~4 kg/10 a	穂揃期まで	2 回以内	散布

ジノテフランを含む 農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む 農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む 農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む 農薬の総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以内、 本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内	4 回以内 (種子浸漬は 1 回 以内、育苗箱への処 理は 1 回以内、本田 では 2 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、 本田では 3 回以内)	6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)

3 6. 登録番号 23365 : フェルテラスタークル箱粒剤 CU

(クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロラントリニプロールを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	ウカ類 イネミズゾウムシ イネトオムシ コメイチュウ ゴブノメイガ フタヒコガ イネトミシ	育苗箱 (30×60×3 cm、使用 土壌約5 L) 1箱当り 50 g	は種前	1回	育苗箱の 床土又は覆土 に均一に混和 する。	1回	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1回以内、 本田での散 布、空中散布、 無人航空機散 布は合計 3回以内)
		高密度こぼ種 する場合は1 kg/10a (育苗箱(30×60×3 cm、 使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)					
		育苗箱 (30×60×3 cm、使用 土壌約5 L) 1箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日		育苗箱の 上から 均一に 散布する。		
	ツマグロヨコバイ イネカサネシ イネコガ類	高密度こぼ種 する場合は1 kg/10a (育苗箱(30×60×3 cm、 使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)					

3 7. 登録番号 23370 : スケルカット顆粒水和剤、

登録番号 23371 : スケルノック顆粒水和剤

(ジノテフラン 40.0 %水和剤)

(1) スケルカット顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
りんご	コナカイラムシ類	2000 倍	200~700 L/10 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	シツメイシ類	2000~4000 倍					

(2) スケルノック顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
りんご	コナカイラムシ類	2000 倍	200~700 L/10 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内

38. 登録番号 23372 : スターガードプラス AL

(ジノテフラン 0.010 % ・ ペンチオピラド 0.010 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ペンチオピラト®を 含む農薬の 総使用回数
なす	うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類	原液	収穫 前日 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 定植時の株元散布は 合計 1 回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計 2 回以内)	3 回以内
ピーマン	うどんこ病 アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計 2 回以内)	
トマト ミニトマト	葉かび病 コナジラミ類					5 回以内 (育苗期の株元散布は 1 回以内、定植時の灌注 は 1 回以内、定植時の 土壌混和は 1 回以内、 散布及び定植後の株元 散布は合計 2 回以内)	
オクラ さやいんげん さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類					3 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
きゅうり	うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類 ウリハムシ					4 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
すいか	アブラムシ類		収穫 7 日前 まで			3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、散布は 2 回以内)	
メロン	コナジラミ類		収穫 3 日前 まで			3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、散布は 2 回以内)	
キャベツ	アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計 2 回以内)	
はくさい	アブラムシ類					3 回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)	

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ジメトランを 含む農薬の 総使用回数	ペントチオラトを 含む農薬の 総使用回数		
ブロッコリー	アブラムシ類	原液	収穫 3 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は 合計 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)	3 回以内		
レタス 非結球レタス	アブラムシ類					4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回以内、育苗期の株元 散布、定植時の土壌混和 及び育苗トレイへの灌注は 合計 1 回以内、散布は 2 回以内)			
ねぎ	アザミウマ類 さび病					4 回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及 び定植時の株元散布は 合計 1 回以内、 生育期の株元灌注は 1 回以内、散布、無人 航空機散布及び 定植後の株元散布は 合計 2 回以内)	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、散布 及び無人航空 機散布は合計 2 回以内)		
豆類（未成熟、ただし、 えだまめ、さ やいんげん、 さやえんどう、実えんどう、 未成熟さ さげを除く）	アブラムシ類		収穫7 日前ま で	2 回 以内		2回以内	3回以内		
えだまめ	アブラムシ類 カメムシ類		収穫7 日前ま で			3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計2回以内)			
未成熟ささげ	アブラムシ類		収穫 前日 まで			2 回以内			
かんきつ	ミカンハモグリガ		収穫 前日 まで	3 回 以内		3 回以内			
りんご	アブラムシ類、 うどんこ病								
なし	ケムシ類、 うどんこ病								
かき	コカイガラムシ類					4 回以内 (塗布は 1 回以内、 散布は 3 回以内)			

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ペンチプレート [®] を 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	コナカイラムシ類、 さび病	原液	収穫 7 日前ま で	3 回 以内	散布	3 回以内 (塗布は 1 回以内)	3 回以内
うめ もも	アブラムシ類		収穫 前日 まで			3 回以内	
おうとう	カメシ類			2 回 以内		2 回以内	
ばら	うどんこ病 黒星病 アブラムシ類 チュウレンジハハチ		発生 初期	3 回 以内		5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)	
花き類・観葉 植物(ばらを除 く)	うどんこ病 アブラムシ類					5 回以内	
樹木類 (つつじ類、つ ばき類を除く)	カメシ類 うどんこ病					5 回以内	
つばき類	カメシ類 うどんこ病					5 回以内 (株元灌注は 2 回以内)	
つつじ類	カメシ類 ツツジゲンハイ うどんこ病					5 回以内	

39. 登録番号 23405：トライスタークル粉剤 DL、
登録番号 23407：クミアイトライスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)

作物名	適 用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	テブフロキンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以内、 本田での散布、空中 散布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内

40. 登録番号 23506：オールスターズプレー
(ジノテフラン 0.010 %液剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
ピーマン	コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 カメシロ類	原液	収穫前日 まで	2回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、散布及び定植後の株元散 布は合計 2 回以内)
トマト ミニトマト	コナジラミ類 アブラムシ類 カメシロ類					5 回以内 (培土混和及び灌漑は合計 1 回以内、育苗期の株元散布 は 1 回以内、定植時の土壌 混和は 1 回以内、散布及び 定植後の株元散布は合計 2 回以内)
なす	アザミウマ類 コナジラミ類 アブラムシ類 カメシロ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、散布及び定植後の株元 散布は合計 2 回以内)
すいか	アブラムシ類		収穫7日前 まで			4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、定植後の株元散布は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
とうがらし類	コナジラミ類 アザミウマ類		収穫前日 まで			3 回以内 (定植時の土壌混和は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
とうがらし(葉)			収穫14日前 まで			3 回以内 (定植時の土壌混和及び 育苗期への灌漑は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
にがうり	コナジラミ類		収穫前日 まで			4 回以内 (定植時の土壌混和は 1 回以 内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類					3 回以内 (定植時の土壌混和及び 育苗期への灌漑は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
ズッキーニ	アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回 以内、散布は 2 回以内)
メロン	コナジラミ類 アザミウマ類		収穫3日前 まで			4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ウリハムシ		収穫前日 まで			

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジメチアザノールを含む 農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ	原液	収穫3日前 まで	2回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回以内、 散布は2回以内)
ブロッコリー	アブラムシ類					3回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回以内、散布及 び無人航空機散布は 合計2回以内)
キャベツ						3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回以内、散布 及び無人航空機散布は 合計2回以内)
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ、 畑わさびを除く) かぶ	キスジノミハムシ					3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)
チンゲンサイ						3回以内 (は種時及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)
畑わさび	アブラムシ類			3回 以内		3回以内
だいこん	アブラムシ類 ダイコンハムシ		収穫7日前 まで	2回 以内		5回以内 (は種時の播溝土壌混和は 1回以内、は種時の全面土壌 混和は1回以内、粒剤の散布 は1回以内、水溶性剤の散布、 液剤の散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)
レタス 非結球レタス	アブラムシ類		収穫3日前 まで			4回以内 (は種前の培土混和は 1回以内、育苗期の株元 散布、定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は合計1回 以内、散布は2回以内)
ねぎ	アザミウマ類					4回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び定植時 の株元散布は合計1回以内、 生育期の株元灌注は1回 以内、散布、無人航空機散布 及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
にら	アブラムシ類 ネギアザミウマ		収穫前日 まで			3回以内 (生育期の株元灌注は 1回以内、散布は2回以内)
アスパラガス	アザミウマ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類					3回 以内

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数
らっきょう	アザミウマ類	原液	収穫前日 まで	3回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3回以内
未成熟とうもろこし	アブラムシ類 カメムシ類					
セルリー	アブラムシ類		収穫14日前 まで	2回 以内		3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)
にんじん			収穫7日前 まで			4回以内 (は種時の土壌混和は1回 以内、生育期の株元灌注は 1回以内、散布は2回以内)
だいず えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤマバエ		収穫7日前 まで	2回 以内		3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布、空中散布、 無人航空機散布は 合計2回以内)
実えんどう さやえんどう	アブラムシ類 ハモグリバエ類 ウラナミジミ カメムシ類		収穫前日 まで			3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
さやいんげん	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 カメムシ類					
okra しょうが	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ クロハネキノコバエ類					
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハバエ カメノコハムシ		収穫7日前 まで	2回 以内		3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
ばれいしょ	ワタアブラムシ		収穫3日前 まで	1回		2回以内
かんしょ	アブラムシ類 コナジラミ類			2回 以内		1回
すいぜんじな	アブラムシ類		収穫7日前 まで	2回 以内		2回以内
ふき	コナジラミ類		収穫7日前 まで			3回以内 (土壌表面散布は1回以内、 散布は2回以内)
りんご	アブラムシ類 キンモンボリガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類		収穫前日 まで	3回 以内		3回以内
もも ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類 モモチョッキリゾウムシ					

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類	原液	収穫前日 まで	3回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3回以内
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケキシイ類 ミカンバエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ ミカンキシラムシ コナシラムシ類 チャノミトリヒメヨコバイ サンホーセカイガラムシ チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類					
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ					
キウイフルーツ	カメムシ類					
かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノハタムシガ アザミウマ類					4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)
ぶどう	カメムシ類 ブドウトラカミキリ チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類					3回以内 (塗布は1回以内)
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類					2回 以内
びわ	カメムシ類 ビワキシラムシ					
あけび(果実)	カメムシ類		収穫14日前 まで	5回 以内		5回以内 (土壌混和は1回以内)
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類 コナシラムシ類					
きく	アブラムシ類 コナシラムシ類 カメムシ類					
樹木類 (つつじ類、 つばき類を除く)	ケムシ類		5回以内			
つつじ類	ケムシ類 ツツジゲンハイ					
つばき類	ケムシ類		5回以内 (株元灌注は2回以内)			

4 1. 登録番号 23624 : ウッドスター
(ジノテフラン 8.0 %液剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
樹木類(つば き類を除く)	ケムシ類	胸高直径 6 cm~10cm : 8~12 mL、 10 cm~20 cm : 12~24 mL、 20 cm~30 cm : 24~36 mL、 30 cm~40 cm : 36~48 mL、 40 cm~50 cm : 48~60 mL、 50 cm~60 cm : 60~72 mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 12 mLを追加する	幼虫発生前 ～ 発生初期 但し新葉 展開後	3回 以内	樹幹 注入	5回以内
くすのき	クスベニヒラカスミカメ		幼虫発生前 ～ 発生初期			
アメリカワ	イカダ類		幼虫発生前 ～ 発生初期 但し新葉 展開後			
さくら	クビアカツカミキリ	注入部直径 6 cm~10cm : 8~12 mL、 10 cm~20 cm : 12~24 mL、 20 cm~30 cm : 24~36 mL、 30 cm~40 cm : 36~48 mL、 40 cm~50 cm : 48~60 mL、 50 cm~60 cm : 60~72 mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 12 mLを追加する	新葉展開後 ～ 落葉前まで			
つばき類	チャドクガ	注入部直径 6 cm~10 cm : 2mL、 10 cm~20 cm : 2~12mL、 20 cm~30 cm : 12~18mL、 30 cm~40 cm : 18~24mL、 40 cm~50 cm : 24~30mL、 50 cm~60 cm : 30~36mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 6 mLを追加する	幼虫発生前 ～ 発生初期			5回以内 (株元灌注 は2回以内)
プラタナス	プラタナスグンバイ	胸高直径 6 cm~10 cm : 2mL、 10 cm~20 cm : 2~12mL、 20 cm~30 cm : 12~18mL、 30 cm~40 cm : 18~24mL、 40 cm~50 cm : 24~30mL、 50 cm~60 cm : 30~36mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 6 mLを追加する	新葉展開後		5回以内	
ぶな	ブナハバチ		新葉展開直前			
ひのき	チャバネカミシ	注入部直径 6 cm~8 cm : 8mL、 8 cm~11 cm : 12mL、 11 cm~14 cm : 16mL、 14 cm~17 cm : 20mL、 17 cm~20 cm : 24mL、 以降、直径が3 cm増す毎に 4 mLを追加する	成虫飛来前		主枝 基部 注入	

4 2. 登録番号 23676 : ウッドセーバー
(ジノテフラン 8.0 %液剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
デコ	デコヒメバチ	胸高直径 6 cm~10 cm:15~30 mL 10 cm~20 cm:30~60mL 以降、直径が 10 cm 増す毎に 30~60 mL を追加する	成虫発生前又は虫えい形成期	3回以内	樹幹注入	5回以内
	ヘニモンメカ		発生前 ~ 発生初期			
ガシユマル	オキナワイチモンジハムシ					

4 3. 登録番号 23685 : ハイポネックス原液 殺虫剤入り
(ジノテフラン 2.5 %複合肥料)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物	アブラムシ類	250 倍	2 L/m ²	発生初期	5 回以内	灌注	5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)

4 4. 登録番号 23705 : サンブラススタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネトヨイムシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ いもち病	育苗箱 (30×60×3 cm) 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 3 日前~移植当日	1 回	育苗箱の苗の上から均一に散布する	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内、本田での湛水散布、無人航空機散布、投げ入れは合計 1 回以内)

4 5. 登録番号 23706 : ガッツスター粒剤、

登録番号 23707 : ゴウケツモンスター粒剤

(ジノテフラン 1.67 %・シメコナゾール 1.5 %・トルプロカルブ 3.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	シメコナゾールを含む農薬の総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲	カメムシ類 ウカ類 ツマグロヨコバイ フタバネコヤカ いもち病 紋枯病 稲こうじ病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 墨黒穂病 内穎褐変病	3 kg/10 a	出穂 5 日前まで 但し、収穫 30 日前まで	1 回	湛水 散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内、本田での湛水散布、無人航空機散布、投げ入れは合計 1 回以内)

4 6. 登録番号 23833 : ハイパーキック箱粒剤、

登録番号 23834 : ゴウケツバスター箱粒剤

(ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	カメムシ類	育苗箱 (30×60×3 cm、使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植当日	1 回	育苗箱の上から均一に散布する。	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内、本田での湛水散布、無人航空機散布、投げ入れは合計 1 回以内)
	ウカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ イネノオシ イネノミ イネノコ イネノハエ フタバネコヤカ いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	高密度には種する場合 1 kg/10 a (育苗箱 (30×60×3 cm、使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50~100 g)	移植 3 日前 ~ 移植当日				
		育苗箱 (30×60×3 cm、使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g					
稲	いもち病 イネノオシ イネノミ	1 kg/10 a	移植時		側条施用		

4 7. 登録番号 23840 : サンフェスタ箱粒剤

(クロラントラニプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %・トルプロカルブ 4.0 %
粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロラントラニプロールを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トルプロカルブを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネトヨイムシ イネミスズムシ コブノメガ ニカメテウ イネツムシ フタホシコガ イコノ類 イネカサネムシ いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌 約5 L) 1箱当り50 g 高密度には種 する場合は1 kg/10 a (育苗箱 (30×60×3 cm、使用土壌 約5 L) 1箱当り 50~100 g)	移植 3日前 ~ 移植 当日	1回	育苗箱 の上か ら均一 に散布 する。	1回	4 回以内 (育苗箱へ の処理及び 側条施用は 合計1回 以内、本田 での散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3回以内)	2 回以内 (移植時ま での処理は 1 回 以内、本田で の湛水散布、 無人航空機散 布、投げ入れ は合計 1 回 以内)
稲	いもち病 イネトヨイムシ イネミスズムシ	1 kg/10 a	移植 時		側条 施用			

4 8. 登録番号 24316 : アースガーデン 4

(エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン
0.00050 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロックス を含む農薬の総 使用回数	ジノテフラン を含む農薬の 総使用回数	ミルベメクチン を含む農薬の 総使用回数	ペンチオピラド を含む農薬の 総使用回数
ばら	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロケシツブチョッキリ チュウレンゾハバチ クロハネキノコバエ類 コガネムシ類 ハスモンヨトウ うどんこ病 灰色かび病 黒星病	原液	発生 初期	2 回 以内	散布	6 回 以内	5 回 以内 (土壌混和は 1 回以内)	2 回 以内	3 回 以内
ひまわり	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロハネキノコバエ類 ハスモンヨトウ アリダチソウゲンハバチ うどんこ病 灰色かび病								
花き類・観 葉植物(ば ら、ひまわ りを除く)	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロハネキノコバエ類 ハスモンヨトウ うどんこ病 灰色かび病								
樹木類 (つつじ類、 つばき類、 ひいらぎも くせい、ま さきを除く)	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 ケムシ類 イラガ類 うどんこ病						5 回 以内		
つばき類 (さざんかを 除く)	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 ケムシ類 イラガ類 ツノヨウムシ うどんこ病						5 回以内(株 元灌注は 2 回以内)		
さざんか	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 ケムシ類 イラガ類 ツノヨウムシ うどんこ病						5 回 以内		

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロックス を含む農薬の総 使用回数	ジノテフラン を含む農薬の 総使用回数	ミルベメクチン を含む農薬の 総使用回数	ペンチオラト を含む農薬の 総使用回数
まさき	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 クムシ類 イガム類 アオハハゴロモ うどんこ病	原液	発生 初期	2回 以内	散布	6回 以内	5回 以内	2回 以内	3回 以内
ひいらぎも くせい	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 クムシ類 イガム類 ヘリガロデントウノミハムシ うどんこ病								
つつじ類	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 クムシ類 イガム類 ツツジグンバイ うどんこ病								

49. 登録番号 24344：スタートレボン W10

(エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	カメシ類 ウカ類 ツマグロヨコバイ	1000倍	60~ 150L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への 処理及び側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計3回以内)
		8倍	0.8L/10a			無人航空機に よる散布		
	ゴボノメダ							
だいず えだまめ	カメシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混 和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は 合計2回以内)
		8倍	0.8L/10a			無人航空機に よる散布		

50. 登録番号 24347：ブレードスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内

51. 登録番号 24413：マグアンプ K 殺虫剤入り

(ジノテフラン 0.20 %複合肥料)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数
なす	アブラム類 コジラ類 アザミヤ類	5g/株	定植時	1 回	植穴土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌 混和は合計 1 回以内、散布及び定植後 の株元散布は合計 2 回以内)
	アブラム類 コジラ類		生育期 但し、収穫前日まで	2 回以内	株元散布	
ピーマン	アブラム類		定植時	1 回	植穴土壌混和	
			生育期 但し、収穫前日まで	2 回以内	株元散布	
きゅうり	アブラム類 コジラ類		定植時	1 回	植穴土壌混和	4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌 混和は合計 1 回以内、定植後の株元散 布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
			生育期 但し、収穫開始 14 日前 まで	1 回以内	株元散布	
トマト ミニトマト	アブラム類 コジラ類		定植時	1 回	植穴土壌混和	5 回以内 (培土混和及び灌水は合計 1 回以内、育 苗期の株元散布は 1 回以内、定植時の 土壌混和は 1 回以内、散布及び定植後 の株元散布は合計 2 回以内)
			生育期 但し、収穫前日まで	2 回以内	株元散布	
いちご	ワタアブラムシ	100g/m ²	定植時	1 回	植穴土壌混和	1 回
花き類・ 観葉植物	アブラム類		生育期	5 回以内	株元散布	5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)

5 2. 登録番号 24530 : オーケストラスタークルエアー

(ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサン 10.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ベンズピリモキサンを 含む農薬の 総使用回数
稲	ツマク [®] ロヨコ バイ ウカ類 カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計 3 回以内)	3 回以内
		250 倍	25L/10a					
		16 倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布		
		8 倍	0.8 L/10 a					

5 3. 登録番号 24608 : ブレードスタークル R ゾル

(ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 カメシ類 ツマク [®] ロヨコ バイ	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側 条施用は 合計 1 回以 内、本田で の散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内
		300 倍	25 L/10 a						
		8 倍	800 mL/10 a			無人航空 機による 散布			

別添2：暴露量の推計（ジノテフランを有効成分として含む製剤）

目次	頁
1. 登録番号20805：スタークル粒剤、 登録番号20806：アルバリン粒剤、 登録番号20807：ホクコースタークル粒剤、 登録番号20959：三井東圧アルバリン粒剤、 登録番号22738：スターガード粒剤 (ジノテフラン1.0%粒剤)	4
2. 登録番号20808：スタークル箱粒剤、 登録番号20960：三井東圧アルバリン箱粒剤 (ジノテフラン2.0%粒剤)	10
3. 登録番号20811：スタークル顆粒水溶剤、 登録番号20812：アルバリン顆粒水溶剤、 登録番号20813：ホクコースタークル顆粒水溶剤、 登録番号20961：三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 (ジノテフラン20.0%水溶剤)	11
4. 登録番号20814：スタークル粉剤DL、 登録番号20815：アルバリン粉剤DL、 登録番号20816：ホクコースタークル粉剤DL、 登録番号20962：三井東圧アルバリン粉剤DL (ジノテフラン0.50%粉剤)	26
5. 登録番号20836：スタークルトレボン粉剤DL (エトフェンプロックス0.30%・ジノテフラン0.50%粉剤)	27
6. 登録番号21025：ホクコーラブサイドスタークル粉剤DL (ジノテフラン0.35%・フサライド2.5%粉剤)	28
7. 登録番号21027：ビームスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%粉剤)	29
8. 登録番号21191：ビームバシスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%・メプロニル3.0%粉剤)	30
9. 登録番号21248：スタークルL粉剤DL、 登録番号21435：スタークルメイトL粉剤DL (ジノテフラン0.35%粉剤)	31
10. 登録番号21259：スタークル液剤10、 登録番号21260：スタークルメイト液剤10、 登録番号24582：アルバリン液剤10 (ジノテフラン10.0%液剤)	32
11. 登録番号21276：スタークル1キロH粒剤、 登録番号21277：スタークルメイト1キロH粒剤 (ジノテフラン3.0%粒剤)	35
12. 登録番号21497：ホクコービルダースタークル箱粒剤 (ジノテフラン2.0%・プロベナゾール10.0%粒剤)	36
13. 登録番号21607：スタークルエアー50、 登録番号21608：スタークルメイトエアー50、 登録番号24012：ファームスター顆粒水溶剤50 (ジノテフラン50.0%水溶剤)	37
14. 登録番号21710：ホクコーラブサイドスタークルフロアブル (ジノテフラン5.0%・フサライド12.0%水和剤)	38

1 5. 登録番号21801：ワイドナーエース粉剤DL (ジノテフラン0.35%・テブフェノジド0.75%・ブプロフェジン1.0%・フサライド 2.5%・フルトラニル2.0%粉剤)	39
1 6. 登録番号21871：コラトップスタークル1 キロ粒剤 (ジノテフラン5.0%・ピロキロン15.0%粒剤)	40
1 7. 登録番号21886：イモチエーススタークル粒剤、 登録番号21888：ホクコーイモチエーススタークル粒剤 (ジノテフラン1.67%・メトミノストロビン4.0%粒剤)	41
1 8. 登録番号21975：トレボンスター粉剤DL (エトフェンプロックス0.40%・ジノテフラン0.20%粉剤)	42
1 9. 登録番号22036：ビームエイトスタークルゾル (ジノテフラン10.0%・トリシクラゾール8.0%水和剤)	43
2 0. 登録番号22037：トレボンスターフロアブル (エトフェンプロックス7.0%・ジノテフラン3.0%水和剤)	44
2 1. 登録番号22063：日農ビームアブロードスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン0.35%・ブプロフェジン1.0%・トリシクラゾール0.50%粉剤)	45
2 2. 登録番号22102：ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%・ペンシクロン1.5%粉剤)	46
2 3. 登録番号22130：わさび用緑風SG (ジノテフラン20.0%水溶剤)	47
2 4. 登録番号22268：ビームモンカットスタークルF粉剤 5 DL (ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%・フルトラニル2.0%粉剤)	48
2 5. 登録番号22332：スタークル豆つぶ、 登録番号22333：クミアイスタークル豆つぶ、 登録番号22495：スタークルメイト豆つぶ (ジノテフラン12.0%剤)	49
2 6. 登録番号22416：Dr. オリゼスタークル箱粒剤、 登録番号23950：オリザエートスター箱粒剤 (ジノテフラン2.0%・プロベナゾール25.0%粒剤)	50
2 7. 登録番号22479：ダブルカットスタークル粉剤DL (ジノテフラン0.35%・カスガマイシン0.11%・トリシクラゾール0.50%粉剤)	51
2 8. 登録番号22642：ホクコートップジンスタークル粉剤DL (ジノテフラン0.35%・チオファネートメチル2.0%粉剤)	52
2 9. 登録番号22725：キックオフ顆粒水和剤 (クロラントラニリプロール4.0%・ジノテフラン15.0%水和剤)	53
3 0. 登録番号22924：ホクコートップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン5.0%・チオファネートメチル20.0%水和剤)	55
3 1. 登録番号22981：ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL (ジノテフラン0.35%・カスガマイシン0.34%・トリシクラゾール0.50%・ バリダマイシン0.30%粉剤)	56
3 2. 登録番号22995：ダブルカットスタークルフロアブル (ジノテフラン10.0%・カスガマイシン1.37%・トリシクラゾール8.0%水和剤)	57
3 3. 登録番号23074：アトラクトン箱粒剤、 登録番号23075：スターダム箱粒剤 (ジノテフラン12.0%粒剤)	58
3 4. 登録番号23076：Dr. オリゼスタークル箱粒剤OS、 登録番号23078：ロングリーチ箱粒剤 (ジノテフラン12.0%・プロベナゾール24.0%粒剤)	59
3 5. 登録番号23113：イッカツエース粉剤DL (ジノテフラン0.35%・テブフェノジド0.75%・カスガマイシン0.34%・ トリシクラゾール0.50%・バリダマイシン0.30%粉剤)	60
3 6. 登録番号23365：フェルテラスタークル箱粒剤CU (クロラントラニリプロール0.75%・ジノテフラン6.0%粒剤)	61

37. 登録番号23370：スケルカット顆粒水和剤、 登録番号23371：スケルノック顆粒水和剤 (ジノテフラン40.0%水和剤)	62
38. 登録番号23372：スターガードプラスAL (ジノテフラン0.010%・ペンチオピラド0.010%水和剤)	63
39. 登録番号23405：トライスタークル粉剤DL、 登録番号23407：クミアイトライスタークル粉剤DL (ジノテフラン0.35%・テブフロキン1.0%粉剤)	64
40. 登録番号23506：オールスターズプレー (ジノテフラン0.010%液剤)	65
41. 登録番号23624：ウッドスター (ジノテフラン8.0%液剤)	66
42. 登録番号23676：ウッドセーバー (ジノテフラン8.0%液剤)	67
43. 登録番号23685：ハイポネックス原液殺虫剤入り (ジノテフラン2.5%複合肥料)	68
44. 登録番号23705：サンブラススタークル箱粒剤 (ジノテフラン2.0%・トルプロカルブ12.0%粒剤)	69
45. 登録番号23706：ガッツスター粒剤、 登録番号23707：ゴウケツモンスター粒剤 (ジノテフラン1.67%・シメコナゾール1.5%・トルプロカルブ3.0%粒剤)	70
46. 登録番号23833：ハイパーキック箱粒剤、 登録番号23834：ゴウケツバスター箱粒剤 (ジノテフラン12.0%・トルプロカルブ9.0%粒剤)	71
47. 登録番号23840：サンフェスタ箱粒剤 (クロラントラニリプロール0.75%・ジノテフラン6.0%・トルプロカルブ4.0% 粒剤)	72
48. 登録番号24316：アースガーデン4 (エトフェンプロックス0.020%・ジノテフラン0.010%・ミルベメクチン0.00050% ・ペンチオピラド0.010%水和剤)	73
49. 登録番号24344：スタートレボンW10 (エトフェンプロックス10.0%・ジノテフラン10.0%乳剤)	74
50. 登録番号24347：ブレードスタークル粉剤DL (ジノテフラン0.35%・フェリムゾン2.0%・フサライド1.5%粉剤)	76
51. 登録番号24413：マグアンプK殺虫剤入り (ジノテフラン0.20%複合肥料)	77
52. 登録番号24530：オーケストラスタークルエア (ジノテフラン9.0%・ベンズピリモキサン10.0%水和剤)	79
53. 登録番号24608：ブレードスタークルRゾル (ジノテフラン9.0%・フェリムゾン13.5%・フサライド13.5%水和剤)	80

＊：本資料は、製剤のハザード区分に応じた防護装備も考慮して作成した。

1. 登録番号20805：スタークル粒剤、登録番号20806：アルバリン粒剤、登録番号20807：ホクコースタークル粒剤、登録番号20959：三井東圧アルバリン粒剤、登録番号22738：スターガード粒剤（ジノテフラ

① 製剤情報	登録番号	20805
	種類・名称	ジノテフラン粒剤(スタークル粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	1 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	3 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						6.2	20.1	2.8	1.5	
2	きゅうり	2.2 kg/10a／育苗期／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						1.2	1.7	0.6	0.1	
3	きゅうり	2.2 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.8	2	0.4	0.2	
4	きゅうり	1.1 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／ 4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.4	1	0.2	0.1	
5	うり類（漬物用）	2.5 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.7	2.2	0.3	0.2	
6	にがうり	0.4 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.1	0.4	0	0	
7	メロン	1.18 kg/10a／育苗期／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						0.7	0.9	0.3	0.1	
8	メロン	1.18 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.3	1	0.1	0.1	
9	すいか	0.92 kg/10a／育苗期／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						0.5	0.7	0.2	0.1	
10	すいか	0.92 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.3	0.8	0.1	0.1	

11	すいか	0.92 kg/10a／生育期 但し、収穫21日前まで／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.3	0.8	0.1	0.1	
12	かぼちゃ	0.76 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.2	0.7	0.1	0.1	
13	ズッキーニ	2.22 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.8	2	0.4	0.2	
14	ズッキーニ	1.11 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.4	1	0.2	0.1	
15	トマト	1.06 kg/10a／は種前／培土混和／5回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						0.6	0.8	0.3	0.1	
16	トマト	3.8 kg/10a／育苗期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						2.2	2.9	1	0.2	
17	トマト	3.8 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.9	3.4	0.4	0.3	
18	トマト	1.9 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.4	1.7	0.2	0.1	
19	ミニトマト	1.17 kg/10a／は種前／培土混和／5回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						0.7	0.9	0.3	0.1	
20	ミニトマト	4.2 kg/10a／育苗期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						2.4	3.2	1.1	0.2	
21	ミニトマト	4.2 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						1	3.7	0.4	0.3	
22	ミニトマト	2.1 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.5	1.9	0.2	0.1	
23	とうがらし類	2.08 kg/10a／育苗期／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						1.2	1.6	0.5	0.1	
24	とうがらし類	4.16 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.8	3.7	0.3	0.3	
25	とうがらし類	2.08 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.4	1.8	0.2	0.1	
26	とうがらし（葉）	2.08 kg/10a／生育期 但し、収穫30日前まで／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.3	1.8	0.1	0.1	
27	なす	2 kg/10a／育苗期／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						1.1	1.5	0.5	0.1	

28	なす	2 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.3	1.8	0.1	0.1	
29	なす	1 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.1	0.9	0.1	0.1	
30	ピーマン	1.7 kg/10a／育苗期／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						1	1.3	0.4	0.1	
31	ピーマン	3.4 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.5	3	0.2	0.2	
32	ピーマン	1.7 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
33	キャベツ	9.6 kg/10a／育苗期／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						7.2	10.9	3.3	0.8	
34	キャベツ	14.4 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						6.4	19.2	2.9	1.5	
35	はくさい	9.6 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						4.3	12.8	1.9	1	
36	ブロッコリー	7.8 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						2.8	10.4	1.3	0.8	
37	だいこん	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						4.4	8	2	0.6	
38	だいこん	12 kg/10a／は種時／全面土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						8.9	16	4	1.2	
39	だいこん	6 kg/10a／生育期 但し、収穫30日前まで／散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						4.4	8	2	0.6	
40	チンゲンサイ	6 kg/10a／定植時／土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						2.7	8	1.2	0.6	
41	チンゲンサイ	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						2.7	8	1.2	0.6	
42	非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイを除く）	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						2.7	8	1.2	0.6	
43	かぶ	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						2.7	8	1.2	0.6	
44	レタス	2.955 kg/10a／は種前／培土混和／4回	1	固形剤（粒剤）_水稻_育苗箱（育苗箱）						2.2	3.3	1	0.3	

45	レタス	6.3 kg/10a／育苗期後半／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						4.8	7.1	2.2	0.5	
46	レタス	12.6 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						7.5	16.8	3.4	1.3	
47	非結球レタス	14 kg/10a／は種前／培土混和／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						10.6	15.8	4.8	1.2	
48	非結球レタス	30 kg/10a／育苗期後半／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						22.6	34	10.3	2.6	
49	非結球レタス	60 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						35.5	80	16.2	6.2	
50	ねぎ	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.8	8	1.3	0.6	
51	ねぎ	6 kg/10a／定植時／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.8	8	1.3	0.6	
52	ねぎ	9 kg/10a／生育期 但し、収穫3日前まで／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						4.3	12	1.9	0.9	
53	わけぎ	6 kg/10a／生育期 但し、収穫21日前まで／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.8	8	1.3	0.6	
54	にんじん	9 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						5.3	12	2.4	0.9	
55	ほうれんそう	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.7	8	1.2	0.6	
56	セルリー	7.4 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						3.3	9.9	1.5	0.8	
57	いちご	8 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／1回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.4	10.7	1.1	0.8	
58	くわい	3 kg/10a／収穫30日前まで／散布／3回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						2	3	0.9	0.2	
59	らっきょう	6 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.1	8	1	0.6	
60	オクラ	9 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／ 3回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						8	12	3.6	0.9	

61	さやいんげん	9 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						8	12	3.6	0.9	
62	しょうが	9 kg/10a／生育期 但し、収穫14日前まで／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						4	12	1.8	0.9	
63	実えんどう	9 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						8	12	3.6	0.9	
64	さやえんどう	9 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						8	12	3.6	0.9	
65	だいず	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						5.3	8	2.4	0.6	
66	えだまめ	6 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						5.3	8	2.4	0.6	
67	しそ	25 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						11.1	33.3	5	2.6	
68	しゅんぎく	9 kg/10a／は種時／播溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						4	12	1.8	0.9	
69	しゅんぎく	9 kg/10a／定植時／植溝土壌混和／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						4	12	1.8	0.9	
70	ふき	20 kg/10a／定植後～生育期（草丈20cm頃まで） 但し、収穫45日前まで／土壌表面散布／3回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						17.8	26.7	8.1	2.1	
71	葉ごぼう	6 kg/10a／は種時／全面土壌混和／2回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						1.8	8	0.8	0.6	
72	葉ごぼう	6 kg/10a／生育期 但し、収穫21日前まで／株元散布／2回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						1.8	8	0.8	0.6	
73	茶	12 kg/10a／摘採7日前まで／株元土壌混和／2回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						7.1	16	3.2	1.2	
74	さとうきび	9 kg/10a／生育期 但し、収穫45日前まで／散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						8	12	3.6	0.9	
75	かんきつ（苗木）	10 kg/10a／育苗期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						13.3	22.2	6.1	1.7	
76	なし（苗木）	110 kg/10a／育苗期／株元散布／1回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						26.1	146.6	11.8	11.3	

77	きく	30 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						26.7	40	12.1	3.1	
78	きく	20 kg/10a／生育期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						17.8	26.7	8.1	2.1	
79	ガーベラ	30 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						26.7	40	12.1	3.1	
80	ガーベラ	20 kg/10a／生育期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						17.8	26.7	8.1	2.1	
81	花き類・観葉植物（きく・ガーベラを除く）	30 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						26.7	40	12.1	3.1	
82	花き類・観葉植物（きく・ガーベラを除く）	20 kg/10a／生育期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						17.8	26.7	8.1	2.1	
83	つつじ類	6 kg/10a／発生初期／株元散布／5回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						8	13.3	3.6	1	
84	いぐさ	6 kg/10a／発生初期／散布／2回	1	固形剤（粒剤）_水稻（手散布）						2.7	6	1.2	0.5	
85	食用ぎく	30 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						26.7	40	12.1	3.1	
86	食用ぎく	20 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／4回	1	固形剤（粒剤）_畑作物（手散布）						17.8	26.7	8.1	2.1	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2. 登録番号20808：スタークル箱粒剤、登録番号20960：三井東圧アルバリン箱粒剤（ジノテフラン2.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	20808
	種類・名称	ジノテフラン粒剤（スタークル箱粒剤）
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	2 %	
⑤ 製剤の形態（製剤/散布液）	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備 考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲 (箱育苗)	50 g/箱／は種前／育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する／ 4回	1	固形剤(粒剤)_水 稲_育苗箱(育苗 箱)						5.3	9.1	2.4	0.7	
2	稲 (箱育苗)	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布 する／4回	1	固形剤(粒剤)_水 稲_育苗箱(育苗 箱)						5.3	9.1	2.4	0.7	

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3. 登録番号20811：スタークル顆粒水溶剤、登録番号20812：アルパリン顆粒水溶剤、登録番号20813：ホクコースタークル顆粒水溶剤、登録番号20961：三井東圧アルパリン顆粒水溶剤（ジノテフラン20.0%水

① 製剤情報	登録番号	20811
	種類・名称	ジノテフラン水溶剤 (スタークル顆粒水溶剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	20 %	
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	顆粒水和剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤 希釈液	1	0.34
	50	5.1
	100	5.1
	400	5.1
	1000	5.1
	2000	5.1
	3000	5.1

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	2000 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	2000	液剤_水稲（手散布）						2.2	7.1	1	0.5	
1*	稲	2000 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	2000	液剤_水稲（機械散布）						0.7	2.3	0.3	0.2	
2	とうもろこし（子実）	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
3	未成熟とうもろこし	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
4	もも	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						15.5	193.9	7	14.9	
4*	もも	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						7	74	3.2	5.7	
5	ネクタリン	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						15.5	193.9	7	14.9	
5*	ネクタリン	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						7	74	3.2	5.7	
6	おうとう	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						10.3	193.9	4.7	14.9	
6*	おうとう	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						4.6	74	2.1	5.7	

7	かき	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						13.4	193.9	6.1	14.9	
7*	かき	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						7.1	74	3.2	5.7	
8	マンゴー	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						10.1	193.9	4.6	14.9	
8*	マンゴー	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						5.3	74	2.4	5.7	
9	小粒核果類	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						15.5	193.9	7	14.9	
9*	小粒核果類	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						7	74	3.2	5.7	
10	ぶどう	1000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	1000	液剤_果樹（棚） （手散布）						68.2	408.9	31	31.5	
10*	ぶどう	1000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	1000	液剤_果樹（棚） （機械散布）						30.8	257	14	19.8	
11	あけび（果実）	2000 倍, 700 L/10a／収穫14日前まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（棚） （手散布）						11.8	340.8	5.4	26.2	
11*	あけび（果実）	2000 倍, 700 L/10a／収穫14日前まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（棚） （機械散布）						6.2	128.5	2.8	9.9	
12	キウイフルーツ	1000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	1000	液剤_果樹（棚） （手散布）						35.4	408.9	16.1	31.5	
12*	キウイフルーツ	1000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	1000	液剤_果樹（棚） （機械散布）						18.5	257	8.4	19.8	
13	びわ	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						25.3	193.9	11.5	14.9	
13*	びわ	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						11.3	74	5.2	5.7	
14	りんご	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						38	193.9	17.3	14.9	
14*	りんご	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						17	74	7.7	5.7	

15	なし	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹 (棚) (手散布)						47.7	204.5	21.7	15.7	
15*	なし	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹 (棚) (機械散布)						20.6	128.5	9.3	9.9	
16	かんきつ (苗木)	50 倍, 50 L/10a／育苗期／株元灌注／5 回	50	液剤_芝 (手散布)						2.6	4.4	1.2	0.3	
17	かんきつ	1000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	1000	液剤_果樹 (立体) (手散布)						58.2	387.7	26.4	29.8	
17*	かんきつ	1000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	1000	液剤_果樹 (立体) (機械散布)						29.6	148	13.5	11.4	
18	オリーブ	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹 (立体) (手散布)						6.7	193.9	3.1	14.9	
18*	オリーブ	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹 (立体) (機械散布)						3.6	74	1.6	5.7	
19	ばれいしょ	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜 (平面) (手散布)						1.3	14.6	0.6	1.1	
19*	ばれいしょ	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜 (平面) (機械散布)						0.9	2.3	0.4	0.2	
20	かんしょ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／1 回	2000	液剤_野菜 (平面) (手散布)						0.6	14.6	0.3	1.1	
20*	かんしょ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／1 回	2000	液剤_野菜 (平面) (機械散布)						0.4	2.3	0.2	0.2	
21	トマト	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／5 回	2000	液剤_野菜 (立体) (手散布)						1.8	6.9	0.8	0.5	
22	トマト	100 倍, 0.5 L/箱／鉢上時又は定植時／灌注／5 回	100	液剤_水稻_育苗箱 (育苗箱)						1.1	1.9	0.5	0.1	
23	ミニトマト	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／5 回	2000	液剤_野菜 (立体) (手散布)						1.8	6.9	0.8	0.5	
24	ミニトマト	100 倍, 0.5 L/箱／鉢上時又は定植時／灌注／5 回	100	液剤_水稻_育苗箱 (育苗箱)						1.1	1.9	0.5	0.1	
25	ブロッコリー	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜 (平面) (手散布)						0.2	14.6	0.1	1.1	

25*	ブロッコリー	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
26	ブロッコリー	100 倍, 0.5 L/箱／定植時／灌注／3 回	100	液剤_水稲_育苗箱 （育苗箱）						1.1	1.9	0.5	0.1	
27	はくさい	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.7	14.6	0.3	1.1	
27*	はくさい	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
28	ピーマン	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						1.1	6.9	0.5	0.5	
29	なす	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						1.1	6.9	0.5	0.5	
30	すいか	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.6	9.7	0.3	0.7	
30*	すいか	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	0.5	0.1	0	
31	とうがらし類	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						1.4	6.9	0.6	0.5	
32	とうがらし類	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	9.7	0.1	0.7	
32*	とうがらし類	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	0.5	0	0	
33	とうがらし（葉）	2000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.2	9.7	0.1	0.7	
33*	とうがらし（葉）	2000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	0.5	0	0	
34	かぼちゃ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	9.7	0.2	0.7	
34*	かぼちゃ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	0.5	0.1	0	
35	かぼちゃ	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／3 回	100	液剤_水稲_育苗箱 （育苗箱）						1.1	1.9	0.5	0.1	

36	にがうり	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						2.1	6.9	0.9	0.5	
37	セルリー	2000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.7	14.6	0.3	1.1	
37*	セルリー	2000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
38	うり類（漬物用）	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	9.7	0.2	0.7	
38*	うり類（漬物用）	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	0.5	0.1	0	
39	うり類（漬物用）	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						2.1	6.9	0.9	0.5	
40	ズッキーニ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.6	9.7	0.3	0.7	
40*	ズッキーニ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	0.5	0.1	0	
41	きゅうり	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						2.7	6.9	1.2	0.5	
42	まくわうり	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.2	6.5	0.1	0.5	
42*	まくわうり	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	0.3	0	0	
43	しそ科葉菜類（しそ、バジルを除く）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
43*	しそ科葉菜類（しそ、バジルを除く）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
44	しそ（花穂）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	9.7	0.1	0.7	
44*	しそ（花穂）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	1.5	0	0.1	
45	アマランサス（茎葉）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1.1	9.7	0.5	0.7	

45*	アマランサス（茎葉）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.4	1.5	0.2	0.1	
46	メロン	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						2.1	6.9	0.9	0.5	
47	メロン	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	9.7	0.2	0.7	
47*	メロン	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	0.5	0.1	0	
48	キャベツ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.7	14.6	0.3	1.1	
48*	キャベツ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
49	キャベツ	50 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／3回	50	液剤_水稲_育苗箱 （育苗箱）						2.2	3.8	1	0.3	
50	だいこん	1000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／5回	1000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	29.1	0.4	2.2	
50*	だいこん	1000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／5回	1000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.8	4.6	0.3	0.4	
51	わさび	2000 倍, 300 L/10a／畑育苗期／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1.9	14.6	0.9	1.1	
51*	わさび	2000 倍, 300 L/10a／畑育苗期／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.5	2.3	0.2	0.2	
52	畑わさび	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.7	14.6	0.3	1.1	
52*	畑わさび	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
53	クレソン	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	3000	液剤_水稲（手散布）						0.2	1.4	0.1	0.1	
53*	クレソン	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	3000	液剤_水稲（機械散布）						0.3	1.5	0.1	0.1	
54	レタス	50 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／4回	50	液剤_水稲_育苗箱 （育苗箱）						2.2	3.8	1	0.3	

55	レタス	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1	14.6	0.4	1.1	
55*	レタス	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.3	2.3	0.1	0.2	
56	非結球レタス	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1	14.6	0.4	1.1	
56*	非結球レタス	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.3	2.3	0.1	0.2	
57	非結球レタス	50 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／4 回	50	液剤_水稲_育苗箱 （育苗箱）						2.2	3.8	1	0.3	
58	ねぎ	400 倍, 400 L/10a／生育期 但し、収穫14日前まで／株元灌注／ 4 回	400	液剤_芝（手散布）						0.9	2.6	0.4	0.2	
59	ねぎ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.4	14.6	0.2	1.1	
59*	ねぎ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
60	ねぎ	1000 倍, 1000 L/10a／生育期 但し、収穫14日前まで／株元灌注 ／4 回	1000	液剤_芝（手散布）						0.9	2.6	0.4	0.2	
61	ねぎ	50 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／4 回	50	液剤_水稲_育苗箱 （育苗箱）						2.2	3.8	1	0.3	
62	わけぎ	400 倍, 400 L/10a／生育期 但し、収穫14日前まで／株元灌注／ 4 回	400	液剤_芝（手散布）						0.9	2.6	0.4	0.2	
63	わけぎ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.4	14.6	0.2	1.1	
63*	わけぎ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
64	にんじん	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	14.6	0.1	1.1	
64*	にんじん	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.3	2.3	0.1	0.2	
65	にんじん	400 倍, 400 L/10a／生育期 但し、収穫21日前まで／株元灌注／ 4 回	400	液剤_芝（手散布）						1.2	2.6	0.5	0.2	

66	しゅんぎく	3000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	9.7	0.2	0.7	
66*	しゅんぎく	3000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
67	チンゲンサイ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.7	14.6	0.3	1.1	
67*	チンゲンサイ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
68	ほうれんそう	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	9.7	0.2	0.7	
68*	ほうれんそう	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
69	非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイ、畑わさびを除く）	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.7	14.6	0.3	1.1	
69*	非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイ、畑わさびを除く）	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
70	非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイ、畑わさびを除く）	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_水稻（手散布）						0.1	2.1	0	0.2	
701*	非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイ、畑わさびを除く）	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_水稻（機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
71	かぶ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.2	14.6	0.1	1.1	
71*	かぶ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
72	だいず	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						5.3	14.6	2.4	1.1	
72*	だいず	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						1.3	2.3	0.6	0.2	
73	あずき	3000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						3.6	9.7	1.6	0.7	
73*	あずき	3000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.8	1.5	0.4	0.1	

74	豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟そらまめを除く）	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
75	未成熟そらまめ	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
76	えだまめ	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1.4	14.6	0.6	1.1	
76*	えだまめ	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.8	2.3	0.3	0.2	
77	未成熟ささげ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
78	実えんどう	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
79	さやえんどう	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
80	さやいんげん	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
81	モロヘイヤ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	14.6	0.2	1.1	
81*	モロヘイヤ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
82	オクラ	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
83	しょうが	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.2	14.6	0.1	1.1	
83*	しょうが	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
84	らっきょう	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	14.6	0.1	1.1	
84*	らっきょう	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
85	にら	400 倍, 400 L/10a／生育期 但し、収穫14日前まで／株元灌注／3 回	400	液剤_芝（手散布）						0.7	2.6	0.3	0.2	

86	にら	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	14.6	0.1	1.1	
86*	にら	2000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
87	にら	1000 倍, 1000 L/10a／生育期 但し、収穫14日前まで／株元灌注 ／3 回	1000	液剤_芝（手散布）						0.7	2.6	0.3	0.2	
88	アスパラガス	2000 倍, 800 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						18.3	27.5	8.3	2.1	
89	てんさい	1000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	1000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	29.1	0.2	2.2	
89*	てんさい	1000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3 回	1000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.5	4.6	0.2	0.4	
90	てんさい	100 倍, 6 L/箱／移植前／灌注／3 回	100	液剤_水稻_育苗箱 （育苗箱）						13.3	22.9	6.1	1.8	
91	きゅうり（葉）	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（立体） （手散布）						0.9	4.6	0.4	0.4	
92	バジル	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	9.7	0.1	0.7	
92*	バジル	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	1.5	0	0.1	
93	きゅうり（花）	3000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（立体） （手散布）						0.9	4.6	0.4	0.4	
94	しょうようほおずき	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（立体） （手散布）						0.5	4.6	0.2	0.4	
95	食用ミニバラ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（立体） （手散布）						3.1	6.9	1.4	0.5	
96	食用カーネーション	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
96*	食用カーネーション	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
97	食用金魚草	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	

97*	食用金魚草	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
98	食用パンジー	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
98*	食用パンジー	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
99	食用トレニア	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
99*	食用トレニア	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
100	食用なでしこ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
100*	食用なでしこ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
101	食用プリムラ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
101*	食用プリムラ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
102	食用エキザカム	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
102*	食用エキザカム	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
103	食用せんにちこう	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.8	9.7	0.4	0.7	
103*	食用せんにちこう	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
104	食用コスモス	3000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2回	3000	液剤_野菜（立体） （手散布）						3.1	6.9	1.4	0.5	
105	しそ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	9.7	0.2	0.7	
105*	しそ	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	

106	なんてん（葉）	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						49.8	83.1	22.7	6.4	
106*	なんてん（葉）	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／2回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						15.9	31.7	7.2	2.4	
107	すいぜんじな	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.5	14.6	0.2	1.1	
107*	すいぜんじな	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／2回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
108	ふき	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1.9	14.6	0.9	1.1	
108*	ふき	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.5	2.3	0.2	0.2	
109	せり	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3回	2000	液剤_水稻（手散布）						0.1	2.1	0	0.2	
109*	せり	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3回	2000	液剤_水稻（機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
110	せり（水耕栽培）	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_水稻（手散布）						0.1	2.1	0	0.2	
110*	せり（水耕栽培）	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／3回	2000	液剤_水稻（機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
111	オリーブ（葉）	2000 倍, 700 L/10a／収穫14日前まで／散布／2回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						6.7	193.9	3.1	14.9	
111*	オリーブ（葉）	2000 倍, 700 L/10a／収穫14日前まで／散布／2回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						3.6	74	1.6	5.7	
112	茶	2000 倍, 400 L/10a／摘採7日前まで／散布／2回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1.7	19.4	0.8	1.5	
112*	茶	2000 倍, 400 L/10a／摘採7日前まで／散布／2回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.4	3.1	0.2	0.2	
113	さとうきび	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／5回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
114	いね科牧草	2000 倍, 300 L/10a／収穫7日前まで／散布／3回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	

115	花き類・観葉植物（きくを除く）	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	
116	花き類・観葉植物（きくを除く）	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						3.2	14.6	1.4	1.1	
116*	花き類・観葉植物（きくを除く）	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.8	2.3	0.3	0.2	
117	花き類・観葉植物（きくを除く）	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_水稻（手散布）						0.5	2.1	0.2	0.2	
117*	花き類・観葉植物（きくを除く）	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_水稻（機械散布）						0.8	2.3	0.3	0.2	
118	花き類・観葉植物（きくを除く）	1000 倍, 1000 L/10a／発生初期／灌注／5 回	1000	液剤_芝（手散布）						1.8	2.6	0.8	0.2	
119	きく	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						3.2	14.6	1.4	1.1	
119*	きく	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.8	2.3	0.3	0.2	
120	きく	1000 倍, 1000 L/10a／発生初期／灌注／5 回	1000	液剤_芝（手散布）						1.8	2.6	0.8	0.2	
121	樹木類（つつじ類、つばき類を除く）	2000 倍, 700 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						116.3	193.9	52.9	14.9	
121*	樹木類（つつじ類、つばき類を除く）	2000 倍, 700 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						37	74	16.8	5.7	
122	樹木類（つつじ類、つばき類を除く）	2000 倍, 700 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						34	56.7	15.5	4.4	
122*	樹木類（つつじ類、つばき類を除く）	2000 倍, 700 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						2.7	5.3	1.2	0.4	
123	つばき類	100 倍, 220 L/10a／発生初期／株元灌注／5 回	100	液剤_芝（手散布）						5.8	9.7	2.6	0.7	
124	つばき類	2000 倍, 700 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						116.3	193.9	52.9	14.9	
124*	つばき類	2000 倍, 700 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						37	74	16.8	5.7	

125	つつじ類	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						49.8	83.1	22.7	6.4	
125*	つつじ類	2000 倍, 300 L/10a／発生初期／散布／5 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						15.9	31.7	7.2	2.4	
126	いぐさ	1000 倍, 150 L/10a／発生初期／散布／2 回	1000	液剤_水稻（手散布）						0.2	2.1	0.1	0.2	
126*	いぐさ	1000 倍, 150 L/10a／発生初期／散布／2 回	1000	液剤_水稻（機械散布）						0.3	2.3	0.1	0.2	
127	かき	1 倍, 0.001 L/10a／発芽前～発芽期／本剤1g当り水1mlの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する。／4 回	1	—	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
128	ぶどう	1 倍, 0.001 L/10a／幼果期まで 但し、収穫30日前まで／本剤1g当り水1mlの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する。／4 回	1	—	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
129	たまねぎ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.4	14.6	0.2	1.1	
129*	たまねぎ	2000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで／散布／4 回	2000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.2	2.3	0.1	0.2	
130	たまねぎ	50 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／4 回	50	液剤_水稻_育苗箱 （育苗箱）						2.2	3.8	1	0.3	
131	食用ぎく	3000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						1.7	9.7	0.8	0.7	
131*	食用ぎく	3000 倍, 300 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.4	1.5	0.2	0.1	
132	みつば	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで、但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （手散布）						0.3	9.7	0.1	0.7	
132*	みつば	3000 倍, 300 L/10a／収穫3日前まで、但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで／散布／2 回	3000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						0.1	1.5	0	0.1	
133	ラズベリー	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						12.9	193.9	5.9	14.9	
133*	ラズベリー	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／2 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						5.9	74	2.7	5.7	
134	えごま（種子）	2000 倍, 300 L/10a／収穫 3 日前まで／散布／5 回	2000	液剤_野菜（立体） （手散布）						6.9	10.3	3.1	0.8	

135	たまねぎ	50 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／4 回	50	液剤_水稻_育苗箱 (育苗箱)						2.2	3.8	1	0.3	
-----	------	-------------------------------	----	--------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	-----	--

¹⁾: AOEL 占有率 = 反復暴露量 (μg ai/kg 体重/日) ÷ 1000 (μg/mg) ÷ AOEL (mg/kg 体重/日) × 100

²⁾: AAOEL 占有率 = 急性暴露量 (μg ai/kg 体重) ÷ 1000 (μg/mg) ÷ AAOEL (mg/kg 体重) × 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重 55.1 kg を用いている。

4. 登録番号20814：スタークル粉剤DL、登録番号20815：アルパリン粉剤DL、登録番号20816：ホクコースタークル粉剤DL、登録番号20962：三井東圧アルパリン粉剤DL（ジノテフラン0.50%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	20814
	種類・名称	ジノテフラン粉剤(スタークル粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.5 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	3 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						29.4	96	13.4	7.4	
2	だいず	3 kg/10a／収穫7日前まで／散布／3回	1	固形剤（粉剤）_畑 作物（手散布）						3.8	5.7	1.7	0.4	
3	えだまめ	3 kg/10a／収穫7日前まで／散布／3回	1	固形剤（粉剤）_畑 作物（手散布）						3.8	5.7	1.7	0.4	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AOEL(mg/kg体重/日) $\times$ 100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AAOEL(mg/kg体重) $\times$ 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

5. 登録番号20836：スタークルトレボン粉剤DL（エトフェンブロックス0.30%・ジノテフラン0.50%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	20836
	種類・名称	エトフェンブロックス・ジノテフラン粉剤(スタークルトレボン粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.5 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時		反復	急性	%AOEL 1)	%AAOEL 2)		
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)				(μg ai/kg 体重)
1	稲	3 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤） 水稲（手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	2.1	6.7	0.9	0.5	調製時:長ズボン・長袖の作業衣

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

6. 登録番号21025：ホクコーラブサイドスタークル粉剤DL（ジノテフラン0.35%・フサライド2.5%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	21025
	種類・名称	ジノテフラン・フサライド粉剤 (ホクコーラブサイドスタークル粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)	製剤: 固体 / 散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

7. 登録番号21027：ビームスタークル粉剤 5 DL（ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	21027
	種類・名称	ジノテフラン・トリシクラゾール粉剤 (ビームスタークル粉剤 5 DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

8. 登録番号21191：ビームバシスタークル粉剤 5 DL（ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%・メプロニル3.0%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	21191
	種類・名称	ジノテフラン・トリシクラゾール・メプロニル粉剤 (ビームバシスタークル粉剤 5 DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫14日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

9. 登録番号21248：スタークルL粉剤DL、登録番号21435：スタークルメイトL粉剤DL（ジノテフラン0.35%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	21248
	種類・名称	ジノテフラン粉剤 (スタークルL粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 0. 登録番号21259：スタークル液剤10、登録番号21260：スタークルメイト液剤10、登録番号24582：アルパリン液剤10（ジノテフラン10.0%液剤）

① 製剤情報	登録番号	21260
	種類・名称	ジノテフラン液剤（スタークルメイト液剤1 0）
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	10 %	
⑤ 製剤の形態（製剤/散布液）	製剤: 液体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤 希釈液	1	25
	5	70
	8	70
	10	70
	14	70
	16	70
	20	70
	30	70
	300	70
	1000	70

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	だいこん	8 倍, 1.6 L/10a／収穫7日前まで／無人航空機による散布／ 5 回	8	液剤_無人航空機 (-)						1.1	40.4	0.5	3.1	
2	キャベツ	8 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／ 3 回	8	液剤_無人航空機 (-)						2	40.4	0.9	3.1	
3	ブロッコリー	8 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／ 3 回	8	液剤_無人航空機 (-)						0.7	40.4	0.3	3.1	
4	ねぎ	10 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	10	液剤_無人航空機 (-)						0.9	32.3	0.4	2.5	
5	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	8	液剤_無人航空機 (-)						41.3	134.7	18.8	10.4	
6	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／空中散布／ 4 回	8	散布による暴露な し（手散布）						39	127	17.7	9.8	
7	稲	16 倍, 1.6 L/10a／収穫7日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	16	液剤_無人航空機 (-)						41.3	134.7	18.8	10.4	
8	稲	300 倍, 25 L/10a／収穫7日前まで／散布／ 4 回	300	液剤_水稻（手散 布）						47.8	155.7	21.7	12	
8*	稲	300 倍, 25 L/10a／収穫7日前まで／散布／ 4 回	300	液剤_水稻（機械散 布）						36.5	119	16.6	9.2	

9	稲	30 倍, 3 L/10a/収穫7日前まで/無人航空機による散布/ 4 回	30	液剤_無人航空機 (-)						41.3	134.7	18.8	10.4	
10	稲	30 倍, 3 L/10a/収穫7日前まで/空中散布/ 4 回	30	散布による暴露なし (手散布)						39	127	17.7	9.8	
11	稲	1000 倍, 150 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 4 回	1000	液剤_水稻 (手散布)						86	280.3	39.1	21.6	
11*	稲	1000 倍, 150 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 4 回	1000	液剤_水稻 (機械散布)						65.7	214.2	29.9	16.5	
12	さとうきび	1000 倍, 300 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 5 回	1000	液剤_野菜 (立体) (手散布)						121.9	182.8	55.4	14.1	
13	さとうきび	14 倍, 2.4 L/10a/収穫7日前まで/無人航空機による散布/ 5 回	14	液剤_無人航空機 (-)						7.5	34.6	3.4	2.7	
14	だいず	8 倍, 0.8 L/10a/収穫7日前まで/無人航空機による散布/ 3 回	8	液剤_無人航空機 (-)						7.4	20.2	3.4	1.6	
15	だいず	8 倍, 0.8 L/10a/収穫7日前まで/空中散布/ 3 回	8	散布による暴露なし (手散布)						12.7	19.1	5.8	1.5	
16	だいず	1000 倍, 300 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 3 回	1000	液剤_野菜 (平面) (手散布)						90	245.6	40.9	18.9	
16*	だいず	1000 倍, 300 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 3 回	1000	液剤_野菜 (平面) (機械散布)						117.8	214.2	53.5	16.5	
17	えだまめ	8 倍, 0.8 L/10a/収穫7日前まで/無人航空機による散布/ 3 回	8	液剤_無人航空機 (-)						1.9	20.2	0.9	1.6	
18	えだまめ	8 倍, 0.8 L/10a/収穫7日前まで/空中散布/ 3 回	8	散布による暴露なし (手散布)						12.7	19.1	5.8	1.5	
19	えだまめ	1000 倍, 300 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 3 回	1000	液剤_野菜 (平面) (手散布)						22.9	245.6	10.4	18.9	
19*	えだまめ	1000 倍, 300 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 3 回	1000	液剤_野菜 (平面) (機械散布)						70.7	214.2	32.1	16.5	
20	らっきょう	8 倍, 1.6 L/10a/収穫前日まで/無人航空機による散布/ 3 回	8	液剤_無人航空機 (-)						0.8	40.4	0.4	3.1	
21	いね科牧草	1000 倍, 300 L/10a/収穫7日前まで/散布/ 3 回	1000	液剤_野菜 (立体) (手散布)						121.9	182.8	55.4	14.1	

22	小麦	1000 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／2回	1000	液剤_野菜（平面） （手散布）						81.9	122.8	37.2	9.4	
22*	小麦	1000 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／2回	1000	液剤_野菜（平面） （機械散布）						58.9	107.1	26.8	8.2	
23	小麦	8 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／無人航空機による散布／2回	8	液剤_無人航空機 （-）						13.5	20.2	6.1	1.6	
24	かんしょ	8 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／1回	8	液剤_無人航空機 （-）						1.8	40.4	0.8	3.1	
25	はくさい	8 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／3回	8	液剤_無人航空機 （-）						2	40.4	0.9	3.1	
26	レタス	8 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／4回	8	液剤_無人航空機 （-）						2.7	40.4	1.2	3.1	
27	非結球レタス	8 倍, 1.6 L/10a／収穫3日前まで／無人航空機による散布／4回	8	液剤_無人航空機 （-）						2.7	40.4	1.2	3.1	
28	かき	20 倍, 8 L/10a／収穫前日まで／無人航空機による散布／4回	20	液剤_無人航空機 （-）						9.3	134.7	4.2	10.4	
29	そてつ	5 倍, 40 L/10a／新葉展開前／株元灌注／5回	5	液剤_芝（手散布）		不浸透性手袋			不浸透性手袋	207.8	346.3	94.4	26.6	

¹⁾:AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾:AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 1. 登録番号21276：スタークル1キロH粒剤、登録番号21277：スタークルメイト1キロH粒剤（ジノテフラン3.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	21276
	種類・名称	ジノテフラン粒剤(スタークル1キロH粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	3 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	1 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粒剤） _水 稲（手散布）						6.2	20.1	2.8	1.5	
2	稲	1 kg/10a／収穫7日前まで／無人航空機による散布／4回	1	固形剤（粒剤） _水 稲（手散布）						6.2	20.1	2.8	1.5	

1): AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 2. 登録番号21497：ホクコービルダースタークル箱粒剤（ジノテフラン2.0%・プロベナゾール10.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	21497
	種類・名称	ジノテフラン・プロベナゾール粒剤 (ホクコービルダースタークル箱粒剤)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		2 %
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)		製剤: 固体／散布時: 固体
⑥ 調製時の予測式		固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲 (箱育苗)	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の稲の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤 (粒剤) 水稲_育苗箱 (育苗箱)		不浸透性手袋	不浸透性防除衣	マスク 1	不浸透性手袋	0.5	0.8	0.2	0.1	
2	稲 (箱育苗)	50 g/箱／緑化期～移植当日／育苗箱の稲の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤 (粒剤) 水稲_育苗箱 (育苗箱)		不浸透性手袋	不浸透性防除衣	マスク 1	不浸透性手袋	0.5	0.8	0.2	0.1	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量 (μg ai/kg体重/日) ÷ 1000 (μg/mg) ÷ AOEL (mg/kg体重/日) × 100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量 (μg ai/kg体重) ÷ 1000 (μg/mg) ÷ AAOEL (mg/kg体重) × 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 3. 登録番号21607：スタークルエア－50、登録番号21608：スタークルメイトエア－50、登録番号24012：ファームスター顆粒水溶剤50（ジノテフラン50.0%水溶剤）

① 製剤情報	登録番号	21607
	種類・名称	ジノテフラン水溶剤(スタークルエア－50)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	50 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	顆粒水和剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液	40	50

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	40 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／無人ヘリコプターによる散布／ 4 回	40	液剤_無人航空機 (-)						3.2	10.3	1.4	0.8	
2	稲	40 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／空中散布／ 4 回	40	散布による暴露なし (手散布)						1.5	4.9	0.7	0.4	

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 4. 登録番号21710：ホクコーラブサイドスタークルフロアブル（ジノテフラン5.0%・フサライド12.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	21710
	種類・名称	ジノテフラン・フサライド水和剤(ホクコーラブサイドスタークルフロアブル)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	5 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	25
希釈液	4	70
	150	70
	500	70

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希積 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	500 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	500	液剤_水稻（手散布）						86	280.3	39.1	21.6	
1*	稲	500 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	500	液剤_水稻（機械散布）						65.7	214.2	29.9	16.5	
2	稲	150 倍, 25 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	150	液剤_水稻（手散布）						47.8	155.7	21.7	12	
2*	稲	150 倍, 25 L/10a／収穫7日前まで／散布／4 回	150	液剤_水稻（機械散布）						36.5	119	16.6	9.2	
3	稲	4 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／無人ヘリコプターによる散布／4 回	4	液剤_無人航空機（-）						41.3	134.7	18.8	10.4	
4	稲	1 倍, 0.2 L/10a／収穫7日前まで／空中散布／4 回	1	散布による暴露なし（手散布）						39	127	17.7	9.8	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

15. 登録番号21801：ワイドナーエース粉剤DL（ジノテフラン0.35%・テブフェノジド0.75%・ブプロフェジン1.0%・フサライド2.5%・フルトラニル2.0%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	21801
	種類・名称	ジノテフラン・テブフェノジド・ブプロフェジン・フサライド・フルトラニル粉剤(ワイドナーエース粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希積 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫14日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AOEL(mg/kg体重/日) $\times$ 100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AAOEL(mg/kg体重) $\times$ 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 6. 登録番号21871：コラトップスタークル1キロ粒剤（ジノテフラン5.0%・ピロキロン15.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	21871
	種類・名称	ジノテフラン・ピロキロン粒剤 (コラトップスタークル1キロ粒剤)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		5 %
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)		製剤: 固体/散布時: 固体
⑥ 調製時の予測式		固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲	1 kg/10a／出穂 5 日前まで／散布／ 4 回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						10.3	33.5	4.7	2.6	
2	稲	1 kg/10a／出穂 5 日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						10.3	33.5	4.7	2.6	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量 (μg ai/kg体重/日) ÷ 1000 (μg/mg) ÷ AOEL (mg/kg体重/日) × 100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量 (μg ai/kg体重) ÷ 1000 (μg/mg) ÷ AAOEL (mg/kg体重) × 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

17. 登録番号21886：イモチエーススタークル粒剤、登録番号21888：ホクコーイモチエーススタークル粒剤（ジノテフラン1.67%・メトミノストロピン4.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	21886
	種類・名称	ジノテフラン・メトミノストロピン粒剤 (イモチエーススタークル粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	1.67 %	
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	3 kg/10a／収穫35日前まで／散布／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						10.3	33.6	4.7	2.6	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

18. 登録番号21975：トレボンスター粉剤DL（エトフェンプロックス0.40%・ジノテフラン0.20%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	21975
	種類・名称	エトフェンプロックス・ジノテフラン粉剤(トレボンスター粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.2 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲	4 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボ ン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	1.1	3.6	0.5	0.3	調製時:長 ズボン・長 袖の作業衣
2	だいず	4 kg/10a／収穫14日前まで／散布／3回	1	固形剤（粉剤）_畑 作物（手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボ ン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	0.2	0.3	0.1	0	調製時:長 ズボン・長 袖の作業衣

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

1 9 . 登録番号22036：ピームエイトスタークルゾル（ジノテフラン10.0%・トリシクラゾール8.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	22036
	種類・名称	ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤（ピームエイトスタークルゾル）
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	10 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤 希釈液	1	25
	8	70
	250	70
	1000	70

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（手散布）						86	280.3	39.1	21.6	
1*	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（機械散布）						65.7	214.2	29.9	16.5	
2	稲	250 倍, 25 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	250	液剤_水稲（手散布）						57.3	186.9	26.1	14.4	
2*	稲	250 倍, 25 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	250	液剤_水稲（機械散布）						43.8	142.8	19.9	11	
3	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫 7 日前まで／無人ヘリコプターによる散布／ 4 回	8	液剤_無人航空機 (-)						41.3	134.7	18.8	10.4	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

20. 登録番号22037：トレボンスターフロアブル（エトフェンブロックス7.0%・ジノテフラン3.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	22037
	種類・名称	エトフェンブロックス・ジノテフラン水和剤(トレボンスターフロアブル)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	3 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤 希釈液	1	25
	8	70
	300	70
	1000	70

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	2.7	8.8	1.2	0.7	調製時:長ズボン・長袖の作業衣
1*	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（機械散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	2.1	6.8	0.9	0.5	調製時:長ズボン・長袖の作業衣
2	稲	300 倍, 25 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	300	液剤_水稲（手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	1.5	4.9	0.7	0.4	調製時:長ズボン・長袖の作業衣
2*	稲	300 倍, 25 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	300	液剤_水稲（機械散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	1.2	3.8	0.5	0.3	調製時:長ズボン・長袖の作業衣
3	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	8	液剤_無人航空機（-）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	1.3	4.3	0.6	0.3	調製時:長ズボン・長袖の作業衣
4	だいず	8 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／無人航空機による散布／ 3 回	8	液剤_無人航空機（-）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	0.2	0.6	0.1	0	調製時:長ズボン・長袖の作業衣

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AOEL(mg/kg体重/日) $\times$ 100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AAOEL(mg/kg体重) $\times$ 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2 1. 登録番号22063：日農ビームアブロードスタークル粉剤 5 DL（ジノテフラン0.35%・プロフェジン1.0%・トリシクラゾール0.50%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	22063
	種類・名称	ジノテフラン・プロフェジン・トリシクラゾール粉剤 (日農ビームアブロードスタークル粉剤 5 DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫 1 4 日前まで／散布／ 4 回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2 2. 登録番号22102：ピーモンセレンスタークル粉剤 5 DL（ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%・ペンシクロン1.5%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	22102
	種類・名称	ジノテフラン・トリシクラゾール・ペンシクロン粉剤 (ピーモンセレンスタークル粉剤 5 DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫21日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2 3. 登録番号22130：わさび用緑風SG（ジノテフラン20.0%水溶剤）

① 製剤情報	登録番号	22130
	種類・名称	ジノテフラン水溶剤(わさび用緑風SG)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	20 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	顆粒水和剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液	2000	50

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備 考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	わさび	2000 倍, 200 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_水稻（手散布）						1.9	14.3	0.8	1.1	
1*	わさび	2000 倍, 200 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_水稻（機械散布）						3.2	16.1	1.5	1.2	

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2 4. 登録番号22268：ピーモンカットスタークルF粉剤 5 DL （ジノテフラン0.35%・トリシクラゾール0.50%・フルトラニル2.0%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	22268
	種類・名称	ジノテフラン・トリシクラゾール・フルトラニル粉剤 (ピーモンカットスタークルF粉剤5DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農業使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希 釈 倍 数	散布時の予測式	防護装備あり								備 考	
					調製時		散布時			反 復	急 性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫14日前まで／散布／4 回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

25. 登録番号22332：スタークル豆つぶ、登録番号22333：クミアイスタークル豆つぶ、登録番号22495：スタークルメイト豆つぶ（ジノテフラン12.0%剤）

① 製剤情報	登録番号	22333
	種類・名称	ジノテフラン剤 (クミアイスタークル豆つぶ)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	12 %	
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	0.5 kg/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						12.3	40.2	5.6	3.1	

1): AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2 6. 登録番号22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、登録番号23950 : オリザエートスター箱粒剤（ジノテフラン2.0%・プロベナゾール25.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	22416
	種類・名称	ジノテフラン・プロベナゾール粒剤 (Dr. オリゼスタークル箱粒剤)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		2 %
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)		製剤: 固体/散布時: 固体
⑥ 調製時の予測式		固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲（箱育苗）	50 g/箱／緑化期～移植当日／育苗箱の苗の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤（粒剤）_水稲_育苗箱（育苗箱）		不浸透性手袋	不浸透性防除衣	マスク 1	不浸透性手袋	0.5	0.8	0.2	0.1	
2	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の苗の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤（粒剤）_水稲_育苗箱（育苗箱）		不浸透性手袋	不浸透性防除衣	マスク 1	不浸透性手袋	0.5	0.8	0.2	0.1	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2.7. 登録番号22479：ダブルカットスタークル粉剤DL（ジノテフラン0.35%・カスガマイシン0.11%・トリシクラゾール0.50%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	22479
	種類・名称	ジノテフラン・カスガマイシン・トリシクラゾール粉剤 (ダブルカットスタークル粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／穂揃期まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

2 8. 登録番号22642：ホクコートップジンスタークル粉剤DL（ジノテフラン0.35%・チオファネートメチル2.0%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	22642
	種類・名称	ジノテフラン・チオファネートメチル粉剤(ホクコートップジンスタークル粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫14日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

29. 登録番号22725：キックオフ顆粒水和剤（クロラントラニプロール4.0%・ジノテフラン15.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	22725
	種類・名称	クロラントラニプロール・ジノテフラン水和剤(キックオフ顆粒水和剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	15 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	顆粒水和剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液	100	5.1
	2000	5.1

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復 ($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	急性 ($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋					
1	なし	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（棚） （手散布）						36.6	156.9	16.6	12.1	
1*	なし	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（棚） （機械散布）						17.3	108.3	7.9	8.3	
2	もも	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						12.1	151.4	5.5	11.6	
2*	もも	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						6.3	67.5	2.9	5.2	
3	ネクタリン	2000 倍, 700 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						12.1	151.4	5.5	11.6	
3*	ネクタリン	2000 倍, 700 L/10a／収穫3日前まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						6.3	67.5	2.9	5.2	
4	うめ	2000 倍, 700 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						12.1	151.4	5.5	11.6	
4*	うめ	2000 倍, 700 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						6.3	67.5	2.9	5.2	
5	かき	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						10.5	151.4	4.8	11.6	
5*	かき	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／4 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						6.5	67.5	2.9	5.2	

6	キャベツ	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／ 3 回	100	液剤_水稲_育苗箱 (育苗箱)						3.2	5.5	1.5	0.4	
7	はくさい	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／ 3 回	100	液剤_水稲_育苗箱 (育苗箱)						3.2	5.5	1.5	0.4	
8	ブロッコリー	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／ 3 回	100	液剤_水稲_育苗箱 (育苗箱)						3.2	5.5	1.5	0.4	
9	レタス	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／ 4 回	100	液剤_水稲_育苗箱 (育苗箱)						3.2	5.5	1.5	0.4	
10	非結球レタス	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／ 4 回	100	液剤_水稲_育苗箱 (育苗箱)						3.2	5.5	1.5	0.4	
11	ねぎ	100 倍, 0.5 L/箱／定植前日～定植時／灌注／ 4 回	100	液剤_水稲_育苗箱 (育苗箱)						3.2	5.5	1.5	0.4	
12	さとうきび	2000 倍, 300 L/10a／収穫30日前まで／散布／ 5 回	2000	液剤_野菜 (立体) (手散布)						6.2	9.3	2.8	0.7	

¹⁾:AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾:AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 0. 登録番号22924：ホクコートップジンスタークルフロアブル（ジノテフラン5.0%・チオファネートメチル20.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	22924
	種類・名称	ジノテフラン・チオファネートメチル水和剤（ホクコートップジンスタークルフロアブル）
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	5.0 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	フロアブル剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液	4	50
	15	50
	150	50
	500	50

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	500 倍, 150 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	500	液剤_水稻（手散布）						41.4	134.9	18.8	10.4	
1*	稲	500 倍, 150 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	500	液剤_水稻（機械散布）						26.9	87.7	12.2	6.7	
2	稲	150 倍, 25 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	150	液剤_水稻（手散布）						23	75	10.4	5.8	
2*	稲	150 倍, 25 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	150	液剤_水稻（機械散布）						14.9	48.7	6.8	3.7	
3	稲	4 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	4	液剤_無人航空機（-）						16.1	52.7	7.3	4.1	
4	稲	4 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／空中散布／ 4 回	4	散布による暴露なし（手散布）						14.5	47.2	6.6	3.6	
5	稲	15 倍, 3 L/10a／収穫14日前まで／空中散布／ 4 回	15	散布による暴露なし（手散布）						14.5	47.2	6.6	3.6	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 1. 登録番号22981：ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL （ジノテフラン0.35%・カスガマイシン0.34%・トリシクラゾール0.50%・バリダマイシン0.30%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	22981
	種類・名称	ジノテフラン・カスガマイシン・トリシクラゾール・バリダマイシン粉剤 (ダブルカットバリダスタークル粉剤 3DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態 (製剤/散布液)	製剤: 固体 / 散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／穂揃期まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AOEL (mg/kg体重/日) $\times$ 100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重) $\div$ 1000($\mu\text{g/mg}$) $\div$ AAOEL (mg/kg体重) $\times$ 100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 2. 登録番号22995：ダブルカットスタークルフロアブル（ジノテフラン10.0%・カスガマイシン1.37%・トリシクラゾール8.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	22995
	種類・名称	ジノテフラン・カスガマイシン・トリシクラゾール水和剤（ダブルカットスタークルフロアブル）
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		10.0 %
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)		製剤: 液体/散布時: 液体
⑥ 調製時の予測式		フロアブル剤等

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤 希釈液	1	10
	8	50
	300	50
	1000	50

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希積 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	1000 倍, 150 L/10a／穂揃期まで／散布／4 回	1000	液剤_水稻（手散布）						41.4	134.9	18.8	10.4	
1*	稲	1000 倍, 150 L/10a／穂揃期まで／散布／4 回	1000	液剤_水稻（機械散布）						26.9	87.7	12.2	6.7	
2	稲	300 倍, 25 L/10a／穂揃期まで／散布／4 回	300	液剤_水稻（手散布）						23	75	10.4	5.8	
2*	稲	300 倍, 25 L/10a／穂揃期まで／散布／4 回	300	液剤_水稻（機械散布）						14.9	48.7	6.8	3.7	
3	稲	8 倍, 0.8 L/10a／穂揃期まで／無人航空機による散布／4 回	8	液剤_無人航空機 (-)						16.1	52.7	7.3	4.1	
4	稲	8 倍, 0.8 L/10a／穂揃期まで／空中散布／4 回	8	散布による暴露なし（手散布）						14.5	47.2	6.6	3.6	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 3. 登録番号23074：アトラクトン箱粒剤、登録番号23075：スターダム箱粒剤（ジノテフラン12.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	23074
	種類・名称	ジノテフラン粒剤(アトラクトン箱粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	12 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗箱）						31.7	54.3	14.4	4.2	
2	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗箱）						31.7	54.3	14.4	4.2	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 4. 登録番号23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤OS、登録番号23078 : ロングリーチ箱粒剤 (ジノテフラン12.0%・プロベナゾール24.0%粒剤)

① 製剤情報	登録番号	23076
	種類・名称	ジノテフラン・プロベナゾール粒剤 (Dr. オリゼスタークル箱粒剤OS)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		12 %
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)		製剤: 固体/散布時: 固体
⑥ 調製時の予測式		固形剤 (粉剤、微粒剤、粒剤等)

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲 (箱育苗)	50 g/箱／移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤(粒剤)_水 稲_育苗箱(育苗 箱)		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク1	不浸透性 手袋	2.9	4.9	1.3	0.4	
2	稲 (箱育苗)	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布 する。／4回	1	固形剤(粒剤)_水 稲_育苗箱(育苗 箱)		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク1	不浸透性 手袋	2.9	4.9	1.3	0.4	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 5. 登録番号23113：イッカツエース粉剤DL（ジノテフラン0.35%・テブフェノジド0.75%・カスガマイシン0.34%・トリシクラゾール0.50%・パリダマイシン0.30%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	23113
	種類・名称	ジノテフラン・テブフェノジド・カスガマイシン・トリシクラゾール・パリダマイシン粉剤(イッカツエース粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希積 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)	($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)			
1	稲	4 kg/10a／穂揃期まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 6. 登録番号23365：フェルテラスタークル箱粒剤CU （クロラントラニプロール0.75%・ジノテフラン6.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	23365
	種類・名称	クロラントラニプロール・ジノテフラン粒剤(フェルテラスタークル箱粒剤CU)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	6 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲（箱育苗）	50 g/箱／は種前／育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 ／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						15.8	27.2	7.2	2.1	
2	稲（箱育苗）	50 g/箱／は種時覆土前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。 ／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						15.8	27.2	7.2	2.1	
3	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。 ／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗 箱）						15.8	27.2	7.2	2.1	

¹⁾:AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾:AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 7. 登録番号23370：スケルカット顆粒水和剤、登録番号23371：スケルノック顆粒水和剤（ジノテフラン40.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	23371
	種類・名称	ジノテフラン水和剤(スケルノック顆粒水和剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	40 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	顆粒水和剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	0.34
希釈液	2000	5.1

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	りんご	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （手散布）						76	387.7	34.5	29.8	調製時、散布時:保護 眼鏡
1*	りんご	2000 倍, 700 L/10a／収穫前日まで／散布／3 回	2000	液剤_果樹（立体） （機械散布）						34	148	15.5	11.4	調製時、散布時:保護 眼鏡

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 8. 登録番号23372：スターガードプラスAL（ジノテフラン0.010%・ペンチオピラド0.010%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	23372
	種類・名称	ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤(スターガードプラスAL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.01 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	エアゾル剤等	
⑥ 調製時の予測式	調製作業による暴露なし	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	70
希釈液		

使用 番号	⑦剤の種類	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	トリガースプレー剤	1 L/回／ - ／ 散布／5回	1	トリガースプレー 剤						0.0233	0.1396	0.0106	0.0107	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

3 9. 登録番号23405：トリスタークル粉剤DL、登録番号23407：クミイトリスタークル粉剤DL（ジノテフラン0.35%・テブフロキン1.0%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	23405
	種類・名称	ジノテフラン・テブフロキン粉剤(トリスタークル粉剤DL)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		0.35 %
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)		製剤: 固体／散布時: 固体
⑥ 調製時の予測式		固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫14日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）						27.5	89.6	12.5	6.9	

1): AOEL占有率＝反復暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重/日)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量($\mu\text{g ai/kg}$ 体重)÷1000($\mu\text{g/mg}$)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 0. 登録番号23506：オールスターズプレー（ジノテフラン0.010%液剤）

① 製剤情報	登録番号	23506
	種類・名称	ジノテフラン液剤(オールスターズプレー)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.01 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	エアゾル剤等	
⑥ 調製時の予測式	調製作業による暴露なし	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	5
希釈液		

使用 番号	⑦剤の種類	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり							備考		
					調製時		散布時			反復	急性		%AOEL 1)	%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	トリガースプレー剤	1 L/回／ - ／ 散布／5回	1	トリガースプレー 剤						0.0019	0.0113	0.0009	0.0009	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 1. 登録番号23624：ウッドスター（ジノテフラン8.0%液剤）

① 製剤情報	登録番号	23624
	種類・名称	ジノテフラン液剤（ウッドスター）
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	8 %	
⑤ 製剤の形態（製剤/散布液）	製剤: 液体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	25
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	樹木類（つばき類を除く）	1 倍, L/10a／幼虫発生前～発生初期　但し新葉展開後／樹幹 注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
2	アメリカフウ	1 倍, L/10a／幼虫発生前～発生初期　但し新葉展開後／樹幹 注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
3	さくら	1 倍, L/10a／幼虫発生前～発生初期　但し新葉展開後、新葉 展開後～落葉前まで／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
4	つばき類	1 倍, L/10a／幼虫発生前～発生初期／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
5	プラタナス	1 倍, L/10a／新葉展開後／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
6	ぶな	1 倍, L/10a／新葉展開直前／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
7	くすのき	1 倍, L/10a／幼虫発生前～発生初期／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
8	ひのき	1 倍, L/10a／成虫飛来前／主枝基部注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 2. 登録番号23676：ウッドセーパー（ジノテフラン8.0%液剤）

① 製剤情報	登録番号	23676
	種類・名称	ジノテフラン液剤（ウッドセーパー）
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	8 %	
⑤ 製剤の形態（製剤/散布液）	製剤: 液体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	25
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	デイゴ	1 倍, L/10a／成虫発生前又は虫えい形成期、発生前～発生初期／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									
2	ガジュマル	1 倍, L/10a／発生前～発生初期／樹幹注入／5 回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 3. 登録番号23685：ハイポネックス原液殺虫剤入り（ジノテフラン2.5%複合肥料）

① 製剤情報	登録番号	23685
	種類・名称	ジノテフラン複合肥料(ハイポネックス原液 殺虫剤入り)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	2.5 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体／散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	乳剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	25
希釈液	250	70

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	花き類・観葉植物	250 倍, 2000 L/10a／発生初期／灌注／5 回	250	液剤_芝（手散布）		不浸透性手袋				41	61.6	18.7	4.7	

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 4. 登録番号23705：サンブラスタークル箱粒剤（ジノテフラン2.0%・トルプロカルブ12.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	23705
	種類・名称	ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤 (サンブラスタークル箱粒剤)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		2 %
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)		製剤: 固体／散布時: 固体
⑥ 調製時の予測式		固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布する／4回	1	固形剤（粒剤）_水稲_育苗箱（育苗箱）						5.3	9.1	2.4	0.7	

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 5. 登録番号23706：ガッツスター粒剤、登録番号23707：ゴウケツモンスター粒剤（ジノテフラン1.67%・シメコナゾール1.5%・トルプロカルブ3.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	23706
	種類・名称	ジノテフラン・シメコナゾール・トルプロカルブ粒剤 (ガッツスター粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	1.67 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（%）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	3 kg/10a／出穂 5 日前まで 但し、収穫 4 5 日前まで／湛水散布／4 回	1	固形剤（粒剤）_水 稲（手散布）						10.3	33.6	4.7	2.6	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 6. 登録番号23833：ハイパーキック箱粒剤、登録番号23834：ゴウケツパスター箱粒剤（ジノテフラン12.0%・トルプロカルブ9.0%粒剤）

① 製剤情報	登録番号	23833
	種類・名称	ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤 (ハイパーキック箱粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	12 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗箱）						31.7	54.3	14.4	4.2	
2	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布する。／4回	1	固形剤（粒剤）_水 稲_育苗箱（育苗箱）						31.7	54.3	14.4	4.2	
3	稲	1 kg/10a／移植時／側条施用／4回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									

¹⁾:AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾:AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 7. 登録番号23840：サンフェスタ箱粒剤（クロラントラニプロール0.75%・ジノテフラン6.0%・トルプロカルブ4.0% 粒剤）

① 製剤情報	登録番号	23840
	種類・名称	クロラントラニプロール・ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤(サンフェスタ箱粒剤)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	6 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲（箱育苗）	50 g/箱／移植3日前～移植当日／育苗箱の上から均一に散布する／4回	1	固形剤（粒剤）_水稲_育苗箱（育苗箱）						15.8	27.2	7.2	2.1	
2	稲	1 kg/10a／移植時／側条施用／4回	1	－	部会決定のとおり、調製時及び施用時の不浸透性手袋の着用を前提に暴露量の算出を省略した。									

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

4 8. 登録番号24316：アースガーデン4（エトフェンブロックス0.020%・ジノテフラン0.010%・ミルベメクチン0.00050% ・ペンチオピラド0.010%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	24316
	種類・名称	エトフェンブロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤 (アースガーデン4)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.01 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	エアゾル剤等	
⑥ 調製時の予測式	調製作業による暴露なし	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	70
希釈液		

使用 番号	⑦剤の種類	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	トリ ガースプレー剤	1 L/回／ - ／ 散布 ／5回	1	トリ ガースプレー 剤			不浸透性 防除衣	マスク 1	不浸透性 手袋	0.0021	0.0124	0.0009	0.0010	

1): AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

2): AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

49. 登録番号24344：スタートレボンW10（エトフェンブロックス10.0%・ジノテフラン10.0%乳剤）

① 製剤情報	登録番号	24344
	種類・名称	エトフェンブロックス・ジノテフラン乳剤(スタートレボンW10)
② 評価対象有効成分		ジノテフラン
③-1 AOEL		0.22 (mg/kg体重/日)
③-2 AAOEL		1.3 (mg/kg体重)
④ 有効成分濃度・含有率		10 %
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)		製剤: 液体/散布時: 液体
⑥ 調製時の予測式		乳剤等

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	25
希釈液	8	70
	1000	70

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希積 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL		%AAOEL
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)	1)		2)
1	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	9	29.5	4.1	2.3	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
1*	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（機械散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	6.9	22.6	3.2	1.7	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
2	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	8	液剤_無人航空機 (-)	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	4.4	14.2	2	1.1	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
3	だいず	1000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 3 回	1000	液剤_野菜（平面） （手散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	9.7	26.4	4.4	2	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
3*	だいず	1000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／ 3 回	1000	液剤_野菜（平面） （機械散布）	マスク 1	不浸透性 手袋	長ズボン・長袖 の作業衣	マスク 1	不浸透性 手袋	12.5	22.6	5.7	1.7	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡

4	だいず	8 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／無人航空機による散布／3 回	8	液剤_無人航空機 (-)	マスク 1	不浸透性手袋	長ズボン・長袖の作業衣	マスク 1	不浸透性手袋	0.8	2.1	0.4	0.2	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
5	えだまめ	1000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	1000	液剤_野菜（平面）（手散布）	マスク 1	不浸透性手袋	長ズボン・長袖の作業衣	マスク 1	不浸透性手袋	2.5	26.4	1.1	2	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
5*	えだまめ	1000 倍, 300 L/10a／収穫14日前まで／散布／3 回	1000	液剤_野菜（平面）（機械散布）	マスク 1	不浸透性手袋	長ズボン・長袖の作業衣	マスク 1	不浸透性手袋	7.5	22.6	3.4	1.7	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡
6	えだまめ	8 倍, 0.8 L/10a／収穫14日前まで／無人航空機による散布／3 回	8	液剤_無人航空機 (-)	マスク 1	不浸透性手袋	長ズボン・長袖の作業衣	マスク 1	不浸透性手袋	0.2	2.1	0.1	0.2	調製時:保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、散布時:保護眼鏡

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

5 0. 登録番号24347：ブレードスタークル粉剤DL（ジノテフラン0.35%・フェリムゾン2.0%・フサライド1.5%粉剤）

① 製剤情報	登録番号	24347
	種類・名称	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド粉剤(ブレードスタークル粉剤DL)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.35 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体／散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤（粉剤、微粒剤、粒剤等）	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数（倍）	経皮吸収率（％）
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時		反復	急性	%AOEL 1)	%AAOEL 2)		
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	4 kg/10a／収穫7日前まで／散布／4回	1	固形剤（粉剤）_水 稲（手散布）					不浸透性 手袋	8.2	26.8	3.7	2.1	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

5 1. 登録番号24413：マグアンプK殺虫剤入り（ジノテフラン0.20%複合肥料）

① 製剤情報	登録番号	24413
	種類・名称	ジノテフラン複合肥料(マグアンプK 殺虫剤入り)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	0.2 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 固体/散布時: 固体	
⑥ 調製時の予測式	固形剤(粉剤、微粒剤、粒剤等)	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数(倍)	経皮吸収率(%)
製剤	1	10
希釈液		

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	なす	5 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／3 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.1	0.9	0.1	0.1	
2	なす	5 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.1	0.9	0.1	0.1	
3	ピーマン	8.5 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／3 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
4	ピーマン	8.5 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／3 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.2	1.5	0.1	0.1	
5	きゅうり	5.5 kg/10a／生育期 但し、収穫開始14日前まで／株元散布／4 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.4	1	0.2	0.1	
6	きゅうり	5.5 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／4 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.4	1	0.2	0.1	
7	トマト	9.5 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／5 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.4	1.7	0.2	0.1	
8	トマト	9.5 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.4	1.7	0.2	0.1	
9	ミニトマト	10.5 kg/10a／生育期 但し、収穫前日まで／株元散布／5 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.5	1.9	0.2	0.1	
10	ミニトマト	10.5 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／5 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						0.5	1.9	0.2	0.1	

11	いちご	40 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／ 1 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						2.4	10.7	1.1	0.8	
12	花き類・観葉植物	100 kg/10a／生育期／株元散布／ 5 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						17.8	26.7	8.1	2.1	
13	花き類・観葉植物	130 kg/10a／定植時／植穴土壌混和／ 5 回	1	固形剤（粒剤）_畑 作物（手散布）						23.1	34.7	10.5	2.7	

¹⁾: AOEL占有率＝反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率＝急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

5 2. 登録番号24530：オーケストラスタークルエアー（ジノテフラン9.0%・ベンズピリモキサン10.0%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	24530
	種類・名称	ジノテフラン・ベンズピリモキサン水和剤 (オーケストラスタークルエアー)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	9 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	フロアブル剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤 希釈液	1	10
	8	50
	16	50
	250	50
	1000	50

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復 (μg ai/kg 体重/日)	急性 (μg ai/kg 体重)	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋					
1	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（手散布）						37.2	121.4	16.9	9.3	
1*	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（機械散布）						24.2	78.9	11	6.1	
2	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫 7 日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	8	液剤_無人航空機（-）						14.5	47.4	6.6	3.6	
3	稲	250 倍, 25 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	250	液剤_水稲（手散布）						24.8	81	11.3	6.2	
3*	稲	250 倍, 25 L/10a／収穫 7 日前まで／散布／ 4 回	250	液剤_水稲（機械散布）						16.1	52.6	7.3	4	
4	稲	16 倍, 1.6 L/10a／収穫 7 日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	16	液剤_無人航空機（-）						14.5	47.4	6.6	3.6	

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量(µg ai/kg体重/日)÷1000(µg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量(µg ai/kg体重)÷1000(µg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。

5 3. 登録番号24608：ブレードスタークルRゾル（ジノテフラン9.0%・フェリムゾン13.5%・フサライド13.5%水和剤）

① 製剤情報	登録番号	24608
	種類・名称	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド水和剤(ブレードスタークルRゾル)
② 評価対象有効成分	ジノテフラン	
③-1 AOEL	0.22 (mg/kg体重/日)	
③-2 AAOEL	1.3 (mg/kg体重)	
④ 有効成分濃度・含有率	9 %	
⑤ 製剤の形態(製剤/散布液)	製剤: 液体/散布時: 液体	
⑥ 調製時の予測式	フロアブル剤等	

【補助1】農薬使用者暴露量の試験成績について
デフォルト値を使用

【補助2】面積について
デフォルト値を使用

⑭ 経皮吸収率	希釈倍数 (倍)	経皮吸収率 (%)
製剤 希釈液	1	10
	8	50
	300	50
	1000	50

使用 番号	⑦作物名	使用方法等 (投下量／使用時期／使用方法／評価に用いた使用回数)	希釈 倍数	散布時の予測式	防護装備あり								備考	
					調製時		散布時			反復	急性	%AOEL 1)		%AAOEL 2)
					マスク	手袋	防護服	マスク	手袋	(μg ai/kg 体重/日)	(μg ai/kg 体重)			
1	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（手散布）		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク 1	不浸透性 手袋	3.6	11.6	1.6	0.9	調製時:保護眼鏡
1*	稲	1000 倍, 150 L/10a／収穫7日前まで／散布／ 4 回	1000	液剤_水稲（機械散布）		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク 1	不浸透性 手袋	2.5	8	1.1	0.6	調製時:保護眼鏡
2	稲	300 倍, 25 L/10a／収穫7日前まで／散布／ 4 回	300	液剤_水稲（手散布）		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク 1	不浸透性 手袋	2	6.4	0.9	0.5	調製時:保護眼鏡
2*	稲	300 倍, 25 L/10a／収穫7日前まで／散布／ 4 回	300	液剤_水稲（機械散布）		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク 1	不浸透性 手袋	1.4	4.5	0.6	0.3	調製時:保護眼鏡
3	稲	8 倍, 0.8 L/10a／収穫7日前まで／無人航空機による散布／ 4 回	8	液剤_無人航空機 (-)		不浸透性 手袋	不浸透性 防除衣	マスク 1	不浸透性 手袋	1.5	5	0.7	0.4	調製時:保護眼鏡

¹⁾: AOEL占有率=反復暴露量(μg ai/kg体重/日)÷1000(μg/mg)÷AOEL(mg/kg体重/日)×100

²⁾: AAOEL占有率=急性暴露量(μg ai/kg体重)÷1000(μg/mg)÷AAOEL(mg/kg体重)×100

なお、体重当たり暴露量の計算には国民の平均体重55.1 kgを用いている。