

別紙3 磐梯朝日国立公園の指定植物種から削除する種 (23種)

科名	和名	学名	現行の 指定植物の 選定条件	指定植物としなかった理由
キンポウゲ科	オオミスミソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>magna</i> (M.Hiroe) Kitam.	②⑦	品種として母種のミスミソウに含めた。
キンポウゲ科	スハマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>variegata</i> (Makino) Nakai	②⑦	品種として母種のミスミソウに含めた。
ウマノスズクサ科	ウスバサイシン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	④a	広義の種としてトウゴクサイシンに含めた。
オトギリソウ科	オシマオトギリ	<i>Hypericum vulcanicum</i> Koidz.	⑤b⑥	北海道(根室・日高・石狩・渡島地方)・本州(青森県・岩手県)に分布し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。
アブラナ科	イワテハタザオ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) Ohwi f. <i>fauriei</i> (H.Boissieu) Ohwi	⑤d⑤e	品種として母種のイワハタザオに含めた。
イワウメ科	ヒメイワカガミ	<i>Schizocodon ilicifolius</i> Maxim. var. <i>ilicifolius</i>	②⑤b⑥	関東地方・中部地方・紀伊半島のおもに太平洋側に分布し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。
イワウメ科	コイワカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i> f. <i>alpinus</i> Maxim.	⑤b⑥	品種として母種のイワカガミに含めた。
ツツジ科	ベニサラサドウダン	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean	⑥⑦	変種として母種のサラサドウダンに含めた。
ツツジ科	ツリガネツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craib	⑤g⑥	本州(山梨県・石川県以西)・四国(徳島県)に分布し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。
ツツジ科	ネモトシャクナゲ	<i>Rhododendron brachycarpum</i> D.Don ex G.Don f. <i>nemotoanum</i> (Makino) Murata	⑥	品種として母種のハクサンシャクナゲに含めた。
サクランソウ科	コツマトリソウ	<i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns et Anderb. f. <i>arctica</i> (Fisch. ex Hook.), <i>comb.nud.</i>	⑤j	品種として母種のツマトリソウに含めた。
リンドウ科	エゾオヤマリンドウ	<i>Gentiana triflora</i> Pall. var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara f. <i>montana</i> (H.Hara) Toyok. et Tanaka	⑤e⑤i⑤j ⑥	品種として母種のエゾリンドウに含めた。
ゴマノハグサ科	ホソバコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. s. subsp. <i>insignis</i> var. <i>japonica</i> (Wettst.) Ohwi	①b⑤g⑤i	変種として母種のミヤマコゴメグサに含めた。
ゴマノハグサ科	マルバコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. s. subsp. <i>insignis</i> var. <i>nummularia</i> (Nakai) T.Yamaz.	①b③⑤g ⑤i	変種として母種のミヤマコゴメグサに含めた。
ゴマノハグサ科	バンダイクワガタ	<i>Veronica schmidtiana</i> Regel var. <i>bandaiana</i> Makino	⑤d⑤i	変種として母種のミヤマクワガタに含めた。
マツムシソウ科	エゾマツムシソウ	<i>Scabiosa jesoensis</i> Nakai	⑥	北海道南西部・青森県に分布し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。

キキョウ科	ハクサンシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara f. <i>violacea</i> (H.Hara) T.Shimizu	⑤d⑥	品種として母種のツリガネニンジンに含めた。
キク科	ミヤマオトコヨモギ	<i>Artemisia pedunculosa</i> Miq.	⑤d	本州中部 高山帯に特産し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。
キク科	センダイトウヒレン	<i>Saussurea</i> sp.	②⑤e⑥	細分せずアサマヒゴタイに含めた。
ユリ科	ハナゼキショウ	<i>Tofieldia nuda</i> Maxim. var. <i>nuda</i>	②⑤b	本州（近畿地方北部）・九州（佐賀県・長崎県）に分布し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。
ホシクサ科	ミヤマヒナホシクサ	<i>Eriocaulon nanellum</i> Ohwi var. <i>nanellum</i>	①b②③⑤j	「改訂新版 日本の野生植物」を参考に細分せず、アズマホシクサに含めた。
ラン科	ウズラバハクサンチドリ	<i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soó f. <i>punctata</i> (Tatew.) F.Maek. ex Toyok.	⑤e⑤i	品種として母種のハクサンチドリに含めた。
ラン科	ミヤマチドリ	<i>Platanthera takedae</i> Makino subsp. <i>takedae</i>	②⑤e	本州中部に分布し、当該公園に分布しないことから選定の対象外とした。